

## 天敵利用フローチャート：トマト

### 発生害虫名

ハモグリバエ類	天敵導入前	導入7日以上前	アフーム乳剤（トマトサビダニ、鱗翅目幼虫にも効果あり） トリガード液剤
		導入前日まで	カスケード乳剤(遅効性)
	天敵導入後	天敵利用継続	カスケード乳剤(遅効性)
		天敵一時中止	アフーム乳剤、トリガード液剤（両剤とも残効7日程度）
		天敵全面中止	薬剤のみ
コナジラミ類	天敵導入前	30日以上前	サンマイトフロアブル、モスピラン水溶剤、ベストガード水溶剤
		導入前日まで	チェス水和剤（アブラムシ類にも効果あり）、アプロード水和剤(遅効性)
	天敵導入後	天敵利用継続	オンシツツヤコバチの2～3週(回)追加放飼 チェス水和剤（アブラムシ類にも効果あり）、アプロード水和剤(遅効性)
		天敵利用中止	サンマイトフロアブル、モスピラン水溶剤、ベストガード水溶剤
トマトサビダニ	天敵導入前	導入7日以上前	アフーム乳剤（ハモグリバエ、鱗翅目幼虫にも効果あり） イオウフロアブル（若干汚れが目立つため収穫開始前まで）
		天敵導入後	天敵利用継続
	天敵一時中止	全面散布	サンマイトフロアブル（コナジラミ類にも効果あり） アフーム乳剤（ハモグリ、鱗翅目幼虫にも効果あり）
	天敵全面中止	ケルセン乳剤の全面散布	

## 天敵利用フローチャート：トマト

### アブラムシ類

天敵導入前	30日以上前	サンマイトフロアブル、モスピラン水溶剤、ベストガード水溶剤	
	導入前日まで	チェス水和剤（コナジラミ類にも効果あり）、オレート液剤の全面散布	
	天敵導入後	天敵利用継続	圃場全面散布      チェス水和剤、オレート液剤
			スポット散布      DDVP乳剤50、モスピラン水溶剤、ベストガード水溶剤 チェス水和剤(コナジラミ類にも効果あり)、オレート液剤
天敵全面中止	圃場全面散布	DDVP乳剤50、モスピラン水溶剤、ベストガード水溶剤	

### ヨトウムシ類 オオタバコガ (鱗翅目幼虫)

天敵導入前	導入7日以上前	下記の薬剤以外ではアファーム乳剤(ハモグリバエ・サビダニにも効果あり)
	導入前日まで	デルフィン顆粒水和剤、ゼンターリ顆粒水和剤、エスマルクDF(BT剤) マッチ乳剤(その他の系統、トマトサビダニにも効果あり)
天敵導入後		デルフィン顆粒水和剤、ゼンターリ顆粒水和剤、エスマルクDF(BT剤) マッチ乳剤(その他の系統、トマトサビダニにも効果あり)