

## 天敵を利用する際の殺虫剤一覧表（トマト）

対象害虫	薬剤名	希釈倍率	天敵への影響	マルハナバチへの影響	備考
ハスモンヨトウ	マッチ乳剤	3,000	-	-	I G R 剤
	デルフィン顆粒水和剤	1,000	-	-	B T 剤
	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000	-	-	B T 剤
オオタバコガ	マッチ乳剤	3,000	-	-	I G R 剤
	ガードジェット水和剤	1,000	-	-	B T 剤
	デルフィン顆粒水和剤	1,000	-	-	B T 剤
	ゼンターリ顆粒水和剤	1,000	-	-	B T 剤
	エスマルク D F	1,000	-	-	B T 剤
コナジラミ類	アプロード水和剤	1,000	-	1 日	I G R 剤
	オレート液剤	100	-	1 日	
	チェス水和剤	3,000	-	-	
アブラムシ類	チェス水和剤	3,000	-	-	
	オレート液剤	100	-	1 日	
	D D V P 乳剤50	1,000 ~ 2,000	1 日	7 日以上	スポット散布のみ
ハモグリバエ類	カスケード乳剤	2,000 ~ 4,000	-	2 日	I G R 剤
	トリガード液剤	1,000	-	1 日	
	アフーム乳剤	2,000	7 日	3 ~ 7 日	オンシツヤコバチに対しては3週間
トマトサビダニ	マッチ乳剤	3,000	-	-	
	イオウフロアブル	400	-		汚れやすい
	ケルセン乳剤40	1500 ~ 2,000	<b>強い影響</b>	1 日	スポット散布のみ

注) - : 影響なし