

促成トマト天敵利用暦 (早植えガラスハウス促成作型)

福岡農総試 病害虫部

月週	8 4	9 1 2 3 4	10 1 2 3 4	11 1 2 3 4	12 1 2 3 4	1 1 2 3 4	2 1 2 3 4	3 1 2 3 4	4 1 2 3 4	5 1 2 3 4	6 1 2 3 4	
管理作業	定植		マルハナバチ導入							芯止め	収穫終了	
コナジラミ類	定植後の天敵放飼 1 2 3 4 週 週 週 週 目 目 目 目	<small>.....</small> (この時期に発生が増加した場合は チェス水和剤で抑える) <small>.....</small>					年明けの天敵放飼 1 2 3 4 週 週 週 週 目 目 目 目 (2月中旬から開始 遅れないように)	<small>.....</small> (この時期に発生が増加した場合は チェス水和剤で抑える) <small>.....</small> 5月下旬からは サマイトフロアブル				
ハモグリバエ類	定植後の天敵放飼 1 2 3 週 週 週 目 目 目 (天敵放飼前に潜孔が多い場合は カスケード乳剤)	<small>.....</small> (発生が増加した場合は カスケード乳剤) <small>.....</small>					年明けの天敵放飼 1 2 3 週 週 週 目 目 目 (冬場に発生がなければ 放飼する必要はない)	年明け放飼をしなかった場合 発生が増加すれば薬剤で対応する トリガード液剤、アフアーム乳剤				
その他病害虫管理	<small>.....</small> トマトサビダニ <small>.....</small> 収穫前まで イオウフロアブル 収穫開始から マッチ乳剤・ケルセン乳剤の珪珪散布 <small>.....</small> ハスモンヨトウ・オオタバコガ <small>.....</small> BT剤、IGR剤					<small>.....</small> トマトサビダニ <small>.....</small> マッチ乳剤全面散布 5月下旬からは ケルセン乳剤の珪珪散布 サマイトフロアブル、アフアーム乳 <small>.....</small> アブラムシ類 <small>.....</small> チェス水和剤全面散布 DDP乳剤の珪珪散布 <small>.....</small> 灰色カビ病 <small>.....</small> <small>.....</small> 葉カビ病 <small>.....</small> <small>.....</small> 疫病 <small>.....</small> <small>.....</small> ウドンコ病 <small>.....</small>						