

各関係機関団体の長 } 殿
各病虫害防除員

福岡県農林業総合試験場長
(福岡県病虫害防除所)

令和3年度病虫害発生予報第12号(3月)について

このことについて、病虫害発生予報第12号を発表したので送付します。

予報第12号

3月における主な病虫害の発生動向は、次のように予想されます。

作物名	病虫害名	現況 (発生量)	3月の発生予報 (発生量)	
		平年比	平年比	前年比
冬春ナス	灰色かび病	やや多	やや多	やや多
	すすかび病	少	少	やや少
	ミナミキイロアザミウマ	少	少	並
冬春イチゴ	灰色かび病	並	並	並
	うどんこ病	並	並	並
	ハダニ類	少	少	少
	アブラムシ類	多	やや多	やや多
茶	カンザワハダニ	多	多	多

注1) 予報の発生量は平年(福岡県の過去10年間)及び参考として前年との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。

注2) 予報の根拠には、巡回調査、防除員の調査、予察灯・トラップでの誘殺状況調査等に基づく発生状況、気象予報からみた病虫害の発生条件を必要に応じて記載しています。

それぞれの条件は、少発生(-)、やや少発生(-~±)、並発生(±)、やや多発生(±~+)、多発生(+)として示し、+-を総合的に判断して発生量を予想しています。

【野菜：冬春ナス】

1 灰色かび病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年よりやや多

(2) 予報の根拠

ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年よりやや多かった(±~+)。

発病果率 0.6% (平年 0.3%、前年 0.01%)

イ 向こう1か月の気象予報および想定される栽培管理からは、並発生の条件となっている(±)。

(3) 防除上注意すべき事項


ア 発病果、発病葉の早期発見に努め、見つけ次第速やかに取り除き、ほ場外へ持ち出し処分する。

イ 不要な枝葉は除去、処分し、通風、採光をよくする。

ウ 多湿にならないように換気に注意するとともに、ほ場の排水対策も心掛ける。

エ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。

オ 同一系統薬剤の連続散布を控え、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



カ 農薬の使用及び散布等にあたっては、p5の内容を確認の上、適切に実施する（以下の病害虫についても同様）。

2 すすかび病

(1) 予報の内容

発生量：平年より少、前年よりやや少

(2) 予報の根拠

ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年より少なかった。（－）。

発病葉率 1.1%（平年 13.3%、前年 3.9%）

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病葉はできるだけ除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。


イ 樹勢が低下すると発病が助長されるため、適切な肥培管理に努める。

ウ 不要な枝葉は除去、処分し、通風、採光をよくする。

エ 多湿にならないように換気に注意するとともに、ほ場の排水対策も心掛ける。

オ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。

カ 同一系統薬剤の連続散布を控え、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



3 ミナミキイロアザミウマ

(1) 予報の内容

発生量：平年より少、前年並

(2) 予報の根拠

ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年より少なかった（－）。

寄生葉率 0.7%（平年 5.5%、前年 0.3%）

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項


ア ほ場内や周辺の雑草は増殖源となるので、除草を徹底する。

イ 防虫ネット（目合い0.4mm以下）を展張し、定期的な薬剤散布を実施する。

ウ 多発後は防除が困難になるので、発生状況に注意し、発生初期の防除を徹底する。

エ 天敵を導入しているほ場では、天敵への影響が大きい薬剤は使用しない。

オ 葉裏への寄生が多いので、散布ムラがないように丁寧に薬剤散布する。なお、薬剤抵抗性の発達を回避するために、同一系統薬剤の連用は避ける。



【野菜：冬春イチゴ】

1 灰色かび病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠


ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

発病果率 0.03%（平年 0.07%、前年 0.09%）

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項


ア 適切にハウス内の換気を行い、湿度の低下を図る。



- イ 発病果、発病葉の早期発見に努め、見つけ次第速やかに取り除き、ほ場外へ持ち出し処分する。
- ウ 収穫後の果梗枝は、放置すると感染源となりやすいので、早めに取り除く。
- エ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。
- オ 不要な下葉は早めに除去する。葉柄の付け根の発病は見つけにくいので発生に注意し、薬剤が十分かかるように丁寧に散布する。
- カ 同一系統薬剤の連続散布を控え、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。


2 うどんこ病

- (1) 予報の内容
発生量：平年・前年並
- (2) 予報の根拠
ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年並であった(±)。
発病株率 0% (平年 0.1%、前年 0%)
イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている(±)。
- (3) 防除上注意すべき事項
ア 適切にハウス内の換気を行い、湿度の低下を図る。
イ 発病果、発病葉の早期発見に努め、見つけ次第速やかに取り除き、ほ場外へ持ち出し処分する。
ウ 収穫後の果梗枝は、放置すると感染源となりやすいので、早めに取り除く。
エ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。
オ 不要な下葉は早めに除去する。下葉かぎ後に防除を行うと効果的で、薬液が葉裏にもかかるように丁寧に散布する。
カ 同一系統薬剤の連続散布を控え、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



3 ハダニ類

- (1) 予報の内容
発生量：平年・前年より少
- (2) 予報の根拠
ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年より少なかった(-)。
寄生株率 5.8% (平年 17.1%、前年 25.1%)
イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている(±)。
- (3) 防除上注意すべき事項
ア ハウス内外の除草を徹底し、本虫の増殖源を絶つ。除草した雑草や摘葉した葉はハウス内に放置せず、ビニル袋等に入れて密封し処分する。
イ 多発後は防除が困難になるので、発生状況に注意し、発生初期の防除を徹底する。なお、防除は摘葉後に行うと効果的である。
ウ ハダニ類に登録のある薬剤の多くは浸透移行性に乏しいため、必要に応じて展着剤を加用し、葉裏に薬液が十分かかるよう、丁寧な散布を心がける。
エ 薬剤抵抗性がつきやすいので、同一系統薬剤の連用は避け、気門封鎖剤も含めて、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。
オ 気門封鎖剤は、卵に効果が低い剤もあり、残効も短いので、約7日間隔で複数回散布が望ましい。
カ ミツバチに影響が少ない薬剤を使用する。
キ 天敵を導入しているほ場では、天敵への影響が大きい薬剤は使用しない。



4 アブラムシ類

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年よりやや多

(2) 予報の根拠

ア 2月5半旬調査の結果、発生量は平年より多かった(+)。

寄生株率4.6%(平年1.9%、前年4.5%)

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている(±)。

(3) 防除上注意すべき事項


ア ハウス内外の除草を徹底し、本虫の増殖源を絶つ。

イ 若い葉や未展開葉、花蕾、果房などに寄生していることが多いので、寄生部位に薬液が十分付着するよう薬剤散布を行う。

ウ 発生初期の防除を徹底する。また、薬剤抵抗性つきやすいので、同一系統薬剤の連用は避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

エ ハダニ類等に対する天敵を導入している場合は、天敵への影響が大きい薬剤は使用しない。

オ ミツバチに影響が少ない薬剤を使用する。



【茶】

1 カンザワハダニ

(1) 予報の内容

発生量：平年より多、前年より多

(2) 予報の根拠


ア 2月5半旬調査の結果、裾葉での発生量は平年より多かった(+)。

50葉当たり成・幼虫数 103.1頭(平年3.9頭、前年4.0頭)

発生葉率 43.0%(平年3.2%、前年4.2%)

発生ほ場率 100.0%(平年51.7%、前年80.0%)

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている(±)。



(3) 防除上の注意

ア 春期の基本防除は、平坦地で3月中旬、山間地で3月下旬頃であるが、孵化幼虫の発生初期の防除効果が高いため、裾葉を中心に発生状況を確認して防除を行う。

イ 昨年、発生が多かった園では成・幼虫と卵の発生量に注意して、表層の発生葉率が2%以上の場合は速やかに防除を行う。

ウ 薬剤は発生状況に応じ、殺卵・殺幼虫効果が高い剤で、裾葉の葉裏にも十分かかるよう丁寧に散布する。

エ 薬剤感受性低下を避けるため、同一系統薬剤の連続散布を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

<予想される向こう1か月の天候（令和4年2月26日～令和4年3月25日）>
 天気は数日の周期で変わるでしょう。
 向こう1か月の気温は、ほぼ平年並でしょう。
 向こう1か月の降水量、日照時間もほぼ平年並でしょう。

向こう1か月の気温・降水量・日照時間（数値は予想される出現確率）

	平均気温	降水量	日照時間
九州北部地方	低30 並30 高40% ほぼ平年並の見込み	少40 並30 多30% ほぼ平年並の見込み	少30 並30 多40% ほぼ平年並見込み

（福岡管区气象台 令和4年2月24日発表1か月予報より抜粋）

病害虫防除所のホームページでは、各種病害虫の発生状況を随時更新しています。
 発生状況の把握や防除の参考にご活用下さい。

○福岡県病害虫防除所のホームページへのアクセス

URL: <https://www.jppn.ne.jp/fukuoka/> または右QRコード①



○Twitter（ツイッター）で定期情報や警報等発出のお知らせを始めました。

Twitterの本アカウント（福岡県農作物病害虫情報）へのアクセス

URL: https://twitter.com/PPDPO_Fukuoka または右QRコード②



農薬の安全・適正使用、飛散防止対策の徹底を！

福岡県では、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理、使用現場における周辺への配慮を周知徹底するとともに、農薬による事故防止を目的として、農薬適正使用の指導を関係機関、団体と一体となって取り組んでいます。使用者の安全はもちろん、周囲の人畜・隣接作物・河川等への配慮についてもご指導をお願いします。

1 農薬適正使用の徹底

○適用作物、使用量や濃度、使用時期、総使用回数などが記載されたラベルをよく確認し、使用基準を遵守する。

※農薬の種類によっては、登録の内容がメーカーによって異なるので、ラベルをよく確認する。

（例：スミチオン水和剤40は、メーカーによって適用作物名や適用病害虫名が異なる）

○有効期限切れの農薬は使用せずに、産業廃棄物として処分する。

2 飛散防止対策の徹底

○風の弱い時に散布する。

○風向、散布方向、散布時間、散布圧などに留意する。

○飛散しにくい農薬（剤型）や飛散が少ないドリフト低減ノズルを使用する。

○散布は場周辺の収穫前の作物には十分注意する。

○農薬散布の実施において、周囲の生産者、住民に周知を図る。

3 保護具の着用

○農薬の散布前に、ラベルの注意・警告マークをよく確認する。マスク、保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、薬液を作成する。

4 農薬の散布後は、必ず散布器具を洗浄

○噴霧器、薬液タンク、ホースなどの散布器具を十分に洗浄し、残液はほ場外への流出や環境や後作に影響を与えないよう配慮して、ほ場内の農作物が植え付けされていない土壌にまく。

5 防除履歴の記帳

○農薬の散布が終わったら、作物名、ほ場の場所、使用年月日、薬剤名、使用濃度、使用量等を正確に記帳する。

6 空容器の処分

○空容器は、地域の農業用廃プラスチック適正処理推進協議会が実施する回収や、産業廃棄物処理業者に委託するなど、適切な処分を行う。また、野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）』で禁止されているので、絶対に行わない。