

各関係機関団体の長
各病虫害防除員 } 殿

福岡県農林業総合試験場長
(福岡県病虫害防除所)

令和4年度病虫害発生予察技術情報第11号について

このことについて、病虫害発生予察技術情報第11号（キウイフルーツかいよう病の冬春季防除）を
発表したので送付します。

技術情報第11号

キウイフルーツかいよう病の冬春季防除について

1 対象作物名：キウイフルーツ

2 病虫害名：キウイフルーツかいよう病 Psa 3系統
(*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* biovar3)

3 本年の発生状況

本年は、防除所調査ほ場（ヘイワード）では発病は認められなかった。しかし、県内全域では新規
の発病園が前年より増加している。また、紅妃（レインボーレッド）のみならず、ヘイワードやその
他の品種でも発生している（データ略）

4 防除上注意すべき事項

福岡管区气象台によると九州北部地方の冬季の気温は、ほぼ平年並の予報であるものの、凍結温度
以下にしばしば遭遇すると、凍害等の樹体の損傷部から病原菌を含む樹液が漏出し、周辺樹へ感染す
るため注意が必要である。

(1) せん定における注意事項

- ・ノコ、ハサミなどの作業器具は、樹ごとに70%エタノールや200ppm以上の濃度の次亜塩素酸ナ
トリウム水溶液（ハイター等）で消毒する。
- ・園地に入る前に手と靴（特に靴底）を消毒する。
- ・園地を出る前に、すべての服、帽子、靴についた植物残渣、靴底の土を除く。
- ・園地を出たあとは、手、服、帽子、靴（特に靴底）を消毒する。
- ・発生園で作業した場合は、そのままの服装で他の園地へは行かない。
- ・枝や幹に発病が認められた場合は、発病部から前年の枝の基部に遡って切除するとともに、薬
剤散布を行う。紅妃（レインボーレッド）に発病が認められた場合は、伐採を行う。

- ・せん定痕は病原菌の感染場所になるため、癒合剤の塗布を行う。

(2) 薬剤の定期的散布

冬春季は、銅剤を中心に定期的な予防散布を行う。特に、傷口からの感染を抑制するため、せん定後の防除は重要である。また、凍害による樹体の損傷が懸念され、昨年の本病発生園地や周囲に発生園地がある場合は予防散布を徹底する。

なお、かいよう病に弱い品種（紅妃（レインボーレッド）等）は、樹液流動開始期（2月）に適宜追加散布する。

(3) ほ場巡回による早期発見・報告

定期的な園内を見回り、樹液の漏出等（写真1、2）の病徴の早期発見に努める。また、発生が疑われる場合は、速やかに関係機関へ連絡し、対応を協議する。



写真1 凍害による亀裂から生じた赤褐色の樹液の流出痕



写真2 枝分岐部からの樹液の漏出

病虫害防除所のホームページでは、各種病虫害の発生状況を随時更新しています。発生状況の把握や防除の参考にご活用下さい。

○福岡県病虫害防除所のホームページへのアクセス
URL: <https://www.jppn.ne.jp/fukuoka/> または右QRコード①



○Twitter（ツイッター）で定期情報や警報等発出のお知らせを始めました。
Twitterの本アカウント（福岡県農作物病虫害情報）へのアクセス
URL: https://twitter.com/PPDPO_Fukuoka または右QRコード②

