

要防除水準(さとうきび・てんさい)

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
さとうきび	カンシャコバネナガカ メムシ	4月(第1世代2.5齢 期)	見取り調査、1圃場あたり30茎	13.3頭/茎	若齢期(2.5齢 期)		沖縄県
てんさい	ヨトウガ(第1世代)	幼虫被害発生初期(道 央地帯で6月下旬)	見歩き調査、1圃場あたり50株 (10株×5ヶ所、5日間隔)	発病株率50%以上	即時		北海道
てんさい	ヨトウガ(第2世代)	幼虫被害発生初期(道 央地帯で8月下旬から)	見歩き調査、1圃場あたり50株 (10株×5ヶ所、5日間隔)	発病株率50%以上	即時		北海道
てんさい	テンサイモグリハナバ エ	12葉期(道東地域で6 月20日頃)	見歩き調査(最低50株)	被害株率100%、さらに食害 面積1/4を超える葉が5枚/ 株(被害葉率42%)以上	即時		北海道
てんさい	褐斑病	初発期以降	見歩き調査、1圃場あたり50株 (10株×5ヶ所、5日間隔)	発病株率50%以上	即時		北海道