

<<注意報>><<注意報>><<注意報>><<注意報>><<注意報>>

28 農病防第 46396 号  
平成 28 年 9 月 6 日

各関係機関長 殿

香川県農業試験場病虫害防除所長  
(公印省略)

平成 28 年度 病虫害発生予察注意報第 9 号について


このことについて、次のとおり発表したので送付します。

平成 28 年度 病虫害発生予察注意報 第 9 号

1. 病虫害名： シロイチモジヨトウ
2. 対象作物： ネギ、アスパラガス、キク、カーネーションなど
3. 発生が予想される地域： **県下全域**
4. 発生程度： **多**
5. 注意報発表の根拠
  - 1) 8 月下旬に実施した青ネギの被害調査では、発生圃場率は 88.9% (平年：59.4%)、被害株率 19.7% (平年：5.2%) であり、発生量は多かった (第 1 表)。
  - 2) 綾歌郡綾川町のフェロモントラップによる 8 月の雄成虫の誘殺数は 397 頭 (平均：169.4 頭) と多かった。
  - 3) 向こう 1 か月の気象は、降水量が平年に比べて多いものの、気温が高い予報であり、今後も発生が増加するものと予想される。

第 1 表 ネギのシロイチモジヨトウ等の被害発生状況

発生圃場率 (%)					被害株率 (%)				
年次	6月下旬	7月下旬	8月下旬	9月下旬	年次	6月下旬	7月下旬	8月下旬	9月下旬
2006	8.3	0	33.3	33.3	2006	1.0		6.1	4.5
2007	0	0	41.7	58.3	2007			4.5	13.5
2008	8.3	50.0	100	100	2008	3.3	3.2	13.0	8.8
2009	0	61.5	58.3	91.7	2009		3.6	7.4	3.2
2010	0	16.7	77.8	83.3	2010		2.9	7.3	30.8
2011	0	83.3	88.2	47.1	2011		1.1	6.3	3.1
2012	0	21.4	43.8	55.6	2012		0.7	1.5	5.2
2013	6.3	11.1	55.6	61.1	2013	1.0	6.0	3.0	2.0
2014	0	16.7	23.5	41.2	2014		0.7	0.3	2.2
2015	0	11.1	72.2	58.8	2015		1.0	2.3	3.7
2016	12.5	66.7	88.9		2016	2.5	5.0	19.6	
平年値	2.3	27.2	59.4	63.0	平年値	1.8	2.4	5.2	7.7



第1図 シロイチモジヨトウのフェロモントラップ誘殺数



写真1 シロイチモジヨトウの幼虫

## 6. 防除対策

- 1) 中老齢幼虫には薬剤の効果が劣ったり、ネギ等では食害して葉の内部に潜り込むと防除効果が低下するので、圃場をよく見回り若齢期に薬剤防除を行う。
- 2) 圃場内及び圃場周辺の雑草は増殖減になるので、除草に努める。
- 3) ハウスの場合は開口部を防虫ネット（4mm目合以下）で被覆し、侵入を防止する。
- 4) 防除薬剤は香川県主要病害虫・雑草防除指針、地域の防除暦等を参考に選定する。
- 5) 作物によって、登録のある薬剤が異なるので、使用にあたってはラベルをよく読んで、登録の有無や収穫前日数、使用回数等使用基準を遵守する。

病害虫防除所インターネットホームページ

URL: <http://www.jpnp.ne.jp/kagawa/>