

## トビイロウンカのベルジャーダスター法を用いた殺虫効果試験

### 1 目的

ベルジャーダスター法による主要粉剤に対する感受性を検討し、次年度以降に向けての防除対策に資する。

### 2 試験方法

#### <雌成虫>

(1) 試験場所 農業開発総合センター生産環境部実験室

(2) 検定方法

サラネット張り円筒ケージ（直径8.5cm，高さ20cm）にイネの幼苗を入れて雌成虫を放飼した。なお，減圧度は200mmHgで処理し，薬量は0.1g（2kg/10a相当量）とした。

(3) 供試薬剤 バッサ粉剤30DL，トレボン粉剤DL，MRジョーカー粉剤DL，スタークル粉剤DL

(4) 供試虫 2015年8月7日に農業開発総合センター内の水田で採集し，累代飼育した雌成虫。

(5) 検定月日 2016年1月13～14日（薬剤処理年月日：2016年1月13日）

(6) 調査方法

調査は処理30分後，1～6時間（1時間毎）後，24時間後の生存虫数と死亡虫数をそれぞれ計数し，死亡率（補正死亡率）を求めた。

#### <幼虫>

(1) 試験場所 農業開発総合センター生産環境部実験室

(2) 検定方法

サラネット張り円筒ケージ（直径8.5cm，高さ20cm）にイネの幼苗を入れて2～3齢幼虫を放飼した。なお，減圧度は200mmHgで処理し，薬量は0.1g（2kg/10a相当量）とした。

(3) 供試薬剤 アプロードロムダンモンカットF粉剤DL

(4) 供試虫

2015年8月7日に農業開発総合センター内の水田で採集し，累代飼育した2～3齢幼虫。

(5) 検定月日 2015年11月6～10日（薬剤処理年月日：2015年11月6日）

(6) 調査方法

調査は処理24，48，72及び96時間後の生存虫数と死亡虫数を計数し，死亡率（補正死亡率）を求めた。

### 3 結果および考察

(1) 雌成虫に対する試験では，バッサ粉剤30DLが2時間後，トレボン粉剤DL及びMR.ジョーカー粉剤DLは5時間後に補正死亡率が90%以上に達するなどの即効性を示した（第1表，第1図）。

しかしながら，スタークル粉剤DLは，これまで同様，処理後6時間はほとんど死亡虫が認められず，24時間が経過した後に補正死亡率がやっと90%に達した（第1表，第1図）。

(2) バッサ粉剤30DL，トレボン粉剤DL及びMR.ジョーカー粉剤DLは，24時間後の補正死亡率もこれまで同様98%以上（第1表，第1図）と実用性に問題はないと考えられた。

スタークル粉剤DLは2010年以降，薬剤処理後致死までに時間を要する傾向が認められているとともに，6時間後の死亡率が60%以下（第1表，第1図）と感受性低下が疑われており，スタークル粉剤DLは，感受性動向に注意が必要と考えられた。

(3) 幼虫に対するアプロードロムダンモンカットF粉剤DLの試験では，2010年までは72時間後には補正死亡率が100%に達していたが，2011年以降，72時間後の補正死亡率は50%を下回っており（第2表，第2図），アプロード剤の感受性低下が疑われ，アプロード剤の実用性は低いと考えられた。

### 4 まとめ

(1) ベルジャーダスター法により2015年に飛来したトビイロウンカの主要本田散布剤に対する薬剤感受性を検討した。

(2) 雌成虫に対して，バッサ粉剤30DL，トレボン粉剤DL及びMR.ジョーカー粉剤DLは感受性に変化は認められていないが，スタークル粉剤DLは感受性低下が疑われ，感受性の動向に注意が必要であった。

(3) 幼虫に対して，アプロード剤の感受性低下が進み，アプロード剤の実用性は低いと考えられた。

第1表 雌成虫に対する薬剤感受性検定結果

1 バッサ粉剤30DL

年	供試 虫数	補 正 死 亡 率 (%)							
		30分後	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後	6時間後	24時間後
2005	32	13	50	94	100				
2006	30	23	93	100					
2009	30	33	67	93	97	97	97	97	97
2010	30	20	47	70	90	90	90	90	90
2011	30	3	13	58	68	84	90	100	
2012	30	0	13	97	100				
2013	34	21	79	91	94	97	100		
2014	46	0	9	30	43	50	61	67	67
2015	49	10	59	96	98	98	98	98	98

2 トレボン粉剤DL





年	供試 虫数	補 正 死 亡 率 (%)							
		30分後	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後	6時間後	24時間後
2005	32	6	31	78	94	100			
2006	30	3	43	67	90	100			
2009	30	17	63	90	90	97	97	100	
2010	30	0	54	75	82	93	93	93	100
2011	30	0	0	23	43	57	63	67	97
2012	30	0	0	67	77	100			
2013	38	34	76	92	97	100			
2014	43	0	74	93	98	100			
2015	47	11	38	62	83	87	91	96	98

3 MR. ジョーカー粉剤DL

年	供試 虫数	補 正 死 亡 率 (%)							
		30分後	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後	6時間後	24時間後
2005	30	0	0	0	0	77	100		
2006	31	0	10	47	100				
2009	30	0	7	60	100				
2010	30	0	0	43	80	90	100		
2011	30	0	0	3	12	29	32	32	100
2012	29	0	0	0	45	100			
2013	31	7	7	58	100				
2014	46	0	4	41	78	98	100		
2015	45	0	0	31	67	89	93	96	100

4 スタークル粉剤DL

年	供試 虫数	補 正 死 亡 率 (%)							
		30分後	1時間後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後	6時間後	24時間後
2005	30	13	37	67	67	77	87	97	100
2006	30	20	80	83	93	100			
2009	30	7	27	40	47	67	77	80	100
2010	30	0	0	10	13	23	40	53	100
2011	30	6	16	22	34	34	41	41	84
2012	31	0	0	7	10	10	16	16	90
2013	32	0	3	6	6	6	9	13	90
2014	50	0	0	0	0	4	6	10	52
2015	30	0	2	2	2	5	5	7	90



第1図 雌成虫に対する薬剤感受性検定結果


第2表 幼虫に対する薬剤感受性検定結果

アプロードロムダンモンカットF粉剤DL

年	供試虫数	補正死亡率 (%)			
		24時間後	48時間後	72時間後	96時間後
2005	32	6	25	100	
2006	30	63	97	100	
2009	30	6	28	100	
2010	30	14	51	100	
2011	30	9	31	43	91
2012	44	7	39	51	70
2013	77	1	13	17	34
2014	33	0	6	23	33
2015	35	0	17	29	63

※ ただし、2005・2006年の供試薬剤はモンラブアプロードロムダンモンカットF粉剤DL。

アプロードロムダンモンカットF粉剤DL



第2図 幼虫に対する薬剤感受性検定結果