

表1 オオタバコガ1～2齢幼虫に対する各種薬剤の殺虫効果(2008)

供試薬剤	系統名	希釈 倍数	補正死虫率 (%)			食害面積率 ^{注1)}		
			24時間後	48時間後	72時間後	24時間後	48時間後	72時間後
アタブロン乳剤		2,000	26.1	61.7	92.3	+	++	+++
マトリックフロアブル	I GR 剤	2,000	3.9	12.0	54.1	+	++	+++
ファルコンフロアブル		2,000	0	50.0	85.7	+	+	+
アデオオン乳剤	合成ピレス ロイド剤	2,000	42.9	52.0	52.0	+	++	+++
トレボン乳剤		1,000	28.4	46.4	46.4	+	++	+++
ラービンフロアブル	カーバメー ト剤	1,000	100	100	100	±		
ガードジェット水和剤 ^{注2)}		1,000	0	10.1	10.1	+	++	+++
ゼンターリ顆粒水和剤	B T 剤	1,000	7.3	92.6	92.6	±	+	+
デルフィン顆粒水和剤		1,000	18.0	100	100	±	±	
アフーム乳剤		2,000	100	100	100	±		
コテツフロアブル		2,000	80.8	84.1	88.1	+	+	+
スピノエース顆粒水和剤	その他	5,000	100	100	100	-		
トルネードフロアブル	新規系統剤	2,000	0.4	84.1	88.1	+	+	+
フェニックス顆粒水和剤		2,000	100	100	100	-		
プレオフロアブル		1,000	92.9	100	100	±	±	
無処理			-	-	-	+	++	+++

注1) 食害面積率 - : 食害なし, ± : 1%以下, + : 1~10%, ++ : 10~25%, +++ : 25%以上

注2) ガードジェット水和剤 2008年12月18日失効

(※農薬使用に当たっては各品目ごとに登録を確認してください。)