

平成12年6月29日

各関係機関長

各病害虫防除員 殿

宮崎県病害虫防除所長

## 病害虫発生予察速報第2号

病害虫名 コブノメイガ

作物名 普通期水稻

### 1 発生状況

- 1) 本年の初飛来は6月8日で例年（6月14日）より早い。
- 2) 初飛来後も6月20日まで断続的な飛来が見られ北諸県郡でやや多い。
- 3) 田植え直後からの飛来で第1世代幼虫による被害が進展している。6月27日現在、幼虫の主体は1令～2令で、主要な飛来は6月2～3半旬と推定される。

### 2 発生予想

第1世代の生育ステージ及び発蛾最盛期は次のように予想される。

発生時期	若令幼虫期	中令幼虫期	老令幼虫期
6月2～3半旬	6月5～6半旬	7月1～2半旬	7月3半旬

第1世代成虫発蛾最盛期 7月4～5半旬

### 3 防除対策

- 1) 本田初期の発生が多い場合は第1世代幼虫を対象に防除を行う。
- 2) 主要な飛来を6月2～3半旬と考えた場合、第2世代幼虫の被害を防止するため、第1世代成虫の発蛾最盛期（7月4～5半旬）を目安に防除を実施する。防除時期は粒剤は発蛾最盛期に、液剤や粉剤の場合は発蛾最盛期から1週間後に散布する。
- 3) 梅雨明け後まで断続的な飛来が予想されるので、今後の予察情報に注意する。