

6 3 6 1 - 6 8 8
平成19年7月12日

各関係機関の長
各病害虫防除員 殿

宮崎県病害虫防除・肥料検査センター所長

病害虫防除情報第1号

果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ）の発生状況についてお知らせします。
果樹園の見回りなどを徹底し、適切な防除指導をお願いします。

1 作物名 果樹全般

2 病害虫名 チャバネアオカメムシ

3 発生状況

- 1) 県内3カ所に設置しているフェロモントラップによると、チャバネアオカメムシ誘殺数は6月4半旬以降急激に増加している（図1）。
- 2) 4月1半旬～6月6半旬の総誘殺数を見ると、いずれの地点においても平成11年の調査開始以降最も多い発生である（表1）。

4 防除上の注意

- 1) 成熟の早いナシ・ブドウ等を集中して加害する可能性があるので注意する。
- 2) 飛来時期や飛来量は地域や園地によって異なるので、園内外の見回りを徹底し、飛来が見られたら、早期に防除を実施する。
- 3) カメムシ類は夜間に果樹園内での密度が高まるため、防除は夕刻もしくは早朝に実施する。
- 4) 8月以降の新成虫の発生については、今後の発生予察情報に注意する。
- 5) 効果のある薬剤等、その他の詳細については、病害虫防除・肥料検査センター、総合農業試験場生物環境部、各農業改良普及センター等関係機関に照会すること。また、農薬使用基準を遵守し、危被害防止に努める。

《連絡先》
病害虫防除・肥料検査センター 邊見
TEL：0985-73-6670 Fax：0985-73-7499
ホームページ：http://www.jppn.ne.jp/miyazaki
E-mail：byogaichu-hiryo@pref.miyazaki.lg.jp




図1 フェロモントラップ旬別誘殺数の推移

平年：延岡市、都農町 はH11～18、都農町 はH12～18の平均値

表1 フェロモントラップによるチャバネアオカメムシの誘殺数（4月1半旬～6月6半旬）

	延岡市	都農町	都農町
平成19年	1954	1883	2084
18年	1133	1234	1255
17年	105	161	88
16年	498	422	462
15年	392	77	79
14年	660	183	177
13年	43	213	54
12年	482	1394	1887
11年	430	562	-
平均	507	548	580

延岡市、都農町 はH11～18、都農町 はH12～18の平均