

各関係機関の長
各病虫害防除員 殿

宮崎県病虫害防除・肥料検査センター所長

平成 2 7 年度病虫害発生予報第 5 号について

平成 2 7 年度病虫害発生予報第 5 号を発表したので送付します。

平成 2 7 年度病虫害発生予報第 5 号

向こう 1 か月間における農作物の主な病虫害の発生動向は、次のように予想されます。

○ 発生予報の概要

作物名	病虫害名	発生量の 平年比	本文での 記載ページ
普通期水稲	1 穂いもち ※※	やや多	2
	2 紋枯病	やや少	2
	3 ごま葉枯病	並	2
	4 トビイロウンカ	やや少	2
	5 斑点米カメムシ類	やや少	3
大豆及び野菜類全般	1 ハスモンヨトウ等のチョウ目（鱗翅目）害虫	やや多	3
施設果菜類	1 ウイルス媒介虫 (アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類)	—	4
	2 タバココナジラミ類	—	4
	3 ミナミキイロアザミウマ	—	4
	4 土壌病虫害	—	5
促成いちご	1 炭疽病他 ※	—	5
	2 その他の病虫害	—	5
果樹全般	1 果樹カメムシ類 ※	—	5
カンキツ (露地栽培)	1 黒点病 ※	やや多	6
	2 かいよう病	並	7
	3 ミカンハダニ	並	7
	4 チャノキイロアザミウマ	並	7
茶	1 炭疽病	やや少	7
	2 もち病	並	7
	3 輪斑病 ※	やや多	
	4 チャノココクモンハマキ	並	8
	5 チャハマキ	並	8
	6 チャノホソガ	並	9
	7 カンザワハダニ	やや多	1 0
	8 チャノキイロアザミウマ	やや多	1 0
	9 チャノミドリヒメヨコバイ	やや多	1 0
	10 クワシロカイガラムシ	やや少	1 0
	11 チャトゲコナジラミ	—	1 1

※※は注意報、※は防除情報を発表

○ 作物の生育状況 (8月上・中旬)

普通期水稲は幼穂伸長期～穂ばらみ期、大豆は栄養成長期、うんしゅうみかんは果実肥大期、茶は3番茶の摘採後であった。

○ 向こう1か月の気象予報

向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)

要素	低い(少ない)	平年並	高い(多い)
気温	40	40	20
降水量	20	40	40
日照時間	40	40	20

(1か月予報 鹿児島地方気象台8月27日発表)

○ 発生予報の根拠および防除対策

普通期水稻

1 穂いもち (やや多)

※※平成27年度病害虫発生予察注意報第3号(8月3日発表)参照

[予報の根拠]

- (1) 8月中旬の巡回調査結果 (葉いもち)
発生面積率：67.5% (平年 48.2%、前年42.5%) 平年よりやや多
発病株率：32.5% (平年 17.1%、前年15.5%) 平年よりやや多

[防除上の注意]

- (1) 出穂期に、夕立など短時間でも降雨があると、発生が増えるおそれがあるので注意する。
(2) 穂いもちを対象に、穂揃期における防除を徹底する。

2 紋枯病 (やや少)

[予報の根拠]

- (1) 8月中旬の巡回調査結果
発生面積率：0.0% (平年 27.4%、前年10.0%) 平年より少
発病株率：0.0% (平年 4.7%、前年 0.7%) 平年より少

[防除上の注意]

- (1) 穂ばらみ期以降はイネの抵抗性が弱まり、高温多湿条件下では上位葉鞘へ進展しやすいので、発病程度が高いほ場では、農薬使用基準の収穫前日数等に注意して防除する。

3 ごま葉枯病 (並)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果
発生面積率：5.0% (平年 3.7%、前年5.0%) 平年並
発病度：0.1 (平年 0.3、前年 0.2) 平年並

[防除上の注意]

- (1) 出穂後の本病の発生は穂枯れの原因になるので、発生の多いほ場では穂揃い期後に防除する。

4 トビイロウンカ (やや少)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果
発生面積率：5.0% (平年 45.3%、前年75.0%) 平年よりやや少

株当たり虫数：0.01頭（平年 0.26頭、前年0.20頭）平年よりやや少

[防除上の注意]

- (1) 今年はトビイロウンカの発生は少ないものの、今後の天候次第では増殖率が高まる
ことが予想されるため定期的にはほ場を観察するなどし、現在低密度のほ場でも注意
する。
- (2) 成虫・幼虫ともに株元に生息しているのので、株元まで十分農薬が到達するように
防除する。

5 斑点米カメムシ類（やや少）

[予報の根拠]

1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：0.0%（平年 7.5%、前年 2.5%）平年より少

20回振り虫数：0.00頭（平年 0.11頭、前年 0.03頭）平年より少

[防除上の注意]

- (1) 本虫による被害は品質を低下させ、等級格下げの主要因になるので、穂揃期とそ
の7~10日後の2回防除を基本とする。残存虫が多い場合は農薬使用基準の収穫前日
数等に注意して追加防除する。

大豆及び野菜類



1 ハスモンヨトウ等のチョウ目害虫（やや多）



[予報の根拠]

- (1) 8月中旬の大豆におけるハスモンヨトウの発生面積率100.0%（平年78.3%）は平
年より多、食害度10.5（平年5.2）は平年よりやや多である。
- (2) 8月中旬のサツマイモにおける、ハスモンヨトウ・ナカジロシタバ等チョウ目害虫
の発生面積率100.0%（平年74.9%）は平年よりやや多、食害面積率9.3%（平年12.3
%）は平年より多である。
- (3) 県内4か所（国富、都城、西都、佐土原）に設置したハスモンヨトウのフェロモン
トラップ調査では、平年並の誘殺数で推移している。

[防除上の注意]

- (1) 早期発見に努め、若齢幼虫期の防除を徹底する。





施設果菜類

1 ウイルス媒介虫(アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類)

[防除上の注意]

- (1) ウイルス病の多くは害虫によって媒介され、生育初期に感染するほど被害が大きくなるので、特に育苗時から媒介虫の防除を徹底し、ウイルスの感染防止と苗による本ぼへのウイルスや媒介虫の持ち込み防止を図る。
- (2) 近紫外線カットフィルムや施設開口部に防虫ネット(0.4mm目合以下)を必ず設置するとともに、施設周囲を光反射マルチ(少なくとも70cm幅以上)で被覆する等の物理的防除手段を活用し、施設内へのウイルス媒介虫の侵入を防止する。
- (3) 育苗ハウスに粘着板を設置し、密度低下に努めるとともに、媒介虫の発生が確認された場合は、すぐに殺虫剤の散布を行い徹底的に駆除する。
- (4) 施設内及びほ場周囲の除草を徹底し、媒介虫の生息・増殖を抑制する。

<虫媒伝染する主なウイルス病>

媒介虫	病原ウイルス	主な感染作物
タバココナジラミ類 ・ハ ^o イオタイプ ^o B(シルバーリーフコナジラミ) ・バイオタイプQ	TYLCV	トマト・ミニトマト・トルコギキョウ
	CCYV	メロン・きゅうり
ミカンキイロアザミウマ等	TSWV	ピーマン・トマト・キク
ミナミキイロアザミウマ	MYSV	きゅうり・メロン・にがうり・すいか
アブラムシ類	CMV、ZYMV、PRSV	きゅうり・メロン・にがうり

2 タバココナジラミ類(バイオタイプB(シルバーリーフコナジラミ)、バイオタイプQ)

[防除上の注意]

- (1) 最近、多くの品目において、各種薬剤に対して感受性の低いタバココナジラミバイオタイプQが発生していることが確認されており、農薬のみによる防除は困難であるので、防虫ネットや黄色粘着板等を組み合わせた総合的な防除対策を講じる。
- (2) タバココナジラミ類は、多くの植物に寄生し増殖するので、育苗・栽培施設内外の除草を徹底するとともに栽培目的以外の作物や観葉植物等を持ち込まない。

3 ミナミキイロアザミウマ

[防除上の注意]

- (1) 本虫によって媒介されるキュウリ黄化えそ病が、徐々に拡大傾向にあることから、今後は現在未発生地域やこれから栽培が始まる作型への感染の拡大が懸念される。

- (2) 最近、各種薬剤に対して感受性の低下が確認されており、多発してからでは防除が難しくなるので、本虫の土中や地表面での蛹化を防止するためのマルチ被覆や誘殺のための粘着板の設置等、総合的な防除対策を講じる。

4 土壌病害虫

[防除上の注意]

- (1) 台風等による大雨でほ場が冠水した場合は、土壌消毒の効果がなくなり、疫病や青枯病、線虫等の被害が発生する恐れがあるので、排水対策を十分行うとともに、必要に応じて再度土壌消毒を行う。
- (2) 薬剤による土壌消毒を行う場合は、事前の耕起、整地は丁寧に行い、土壌水分の調整を適切に行う。
- (3) 育苗中の苗や定植後の苗の生育状況を観察し、疫病等の発病が疑われる場合は、早めに防除を行う。

促成いちご

1 炭疽病他

※平成27年度病害虫防除情報第2号(6月3日発表)参照

[防除上の注意]

- (1) 罹病苗の持ち込みは、本ほ内での感染源となるため健全苗の定植に努める。
苗床で発病した苗については、その周囲の苗も感染苗と見なし、適切に処分する。
(発病苗及び半径3ポット程度は廃棄する。)
- (2) 定植後に発病した株は、早期に除去しビニール袋に密封するなど病原菌の拡大防止に努める。

2 その他の病害虫

[防除上の注意]

- (1) 近年、苗からの持ち込みによるうどんこ病やハダニ類の発生が多く、定植初期に病害虫の発生が多い状況が見られるので、定植前に防除を徹底し、本ほに病害虫を持ち込まないように注意する。









果樹全般

1 果樹カメムシ類

※平成27年度病害虫防除情報第5号(7月27日発表)参照

[防除上の注意]

- (1) フェロモントラップおよび予察灯調査におけるツヤアオカメムシの誘殺数は平年並であるが、チャバネアオカメムシの誘殺数は7月、8月に増加している。ヒノキのきゅう果の着生量が少なく、ヒノキに定着できなかった越冬世代成虫が長期にわたって移動を繰り返していたものと推察される。
- (2) 果樹カメムシ類は園外から飛来し、地域や時期によって発生量が大きく変動するので、園内外を見回り、早期発見・早期防除に努める。
- (3) うんしゅうみかんでは、色ぬけから着色始め頃の加害は落果を生じやすく、特に注意が必要である。



カンキツ (露地栽培)

1 黒点病 (やや多)

※平成27年度病害虫防除情報第6号(7月27日発表)参照

[予報の根拠]

1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率 : 72.3% (平年 46.7%、前年 77.8%) 平年よりやや多

発病果率 : 45.7% (平年 19.2%、前年 33.7%) 平年より多

[防除上の注意]

- (1) 感染源となる枯れ枝は、可能な限り取り除き園外に持ち出して適切に処分する。
- (2) 防除間隔の目安は積算降水量250mmで、降水量が少なくても1か月後には次の防除が必要である。

2 かいよう病 (並)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：5.6% (平年 13.9%、前年0.0%) 平年よりやや少
発病果率：2.0% (平年 1.2%、前年 0.0%) 平年よりやや多

[防除上の注意]

- (1) 罹病した枝葉・果実は伝染源となるので可能な限り取り除き、園外に持ち出して適切に処理する。
- (2) 風雨による枝葉の損傷を少なくするため防風垣を整備する。特に台風の襲来が予想される時は事前に防除を行う。

3 ミカンハダニ (並)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：44.5% (平年 46.0%、前年 55.5%) 平年並
寄生葉率：9.18% (平年 10.82%、前年12.00%) 平年並

[防除上の注意]

- (1) 生息密度が高くなると防除が困難になるので、寄生葉率30%または1葉当たり虫数0.5~1頭を目安に防除を行う。
- (2) 同一系統農薬の連用を避け、作用性の異なる農薬のローテーション散布を実施する。

4 チャノキイロアザミウマ (並)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：0.0% (平年 3.2%、前年 5.6%) 平年並
寄生果率：0.0% (平年 0.1%、前年 0.1%) 平年並

[防除上の注意]

- (1) 果実に寄生すると収穫果実の外観を損なうので、10果当たり虫数3頭を目安に増殖初期に防除する。

茶

1 炭疽病 (やや少)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：35.3% (平年 56.5%、前年 52.9%) 平年よりやや少
m²当たり病葉数：1.1葉 (平年 11.0葉、前年 3.4葉) 平年より少

[防除上の注意]

- (1) 本病は新芽の生育時に雨が多いと発生しやすい。秋芽は生育期間が長く感染の機会も多いため、開葉初期(萌芽~一葉期)に予防効果の高い農薬を散布し、その10日~14日後に治療効果の高い農薬を散布し防除する。

2 もち病 (並)

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率 : 5.9% (平年 3.6%、前年 5.9%) 平年並
 m²当たり病葉数 : 0.1葉 (平年 1.3葉、前年 0.1葉) 平年並

[防除上の注意]

- (1) 秋芽の生育期に雨が多いと感染しやすい。特に中山間地域では発生が多いので秋芽生育期に炭疽病と同時に防除する。

3 輪斑病 (やや多)

※平成27年度病害虫防除情報第7号(7月27日発表)参照

[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率 : 29.4% (平年 19.4%、前年 17.6%) 平年よりやや多
 m²当たり病葉数 : 0.7葉 (平年 0.6葉、前年 0.5葉) 平年よりやや多

[防除上の注意]

- (1) 萌芽から開葉期にかけて、包葉などが取れたときにできる傷口から輪斑病菌が感染すると新梢枯死症が発生するので、輪斑病の発生ほ場では秋芽の萌芽期～2葉期に防除する。特に発生が多いほ場では5～7日間隔で2回防除する。

4 チャノコカクモンハマキ (並)





[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率 : 0.0% (平年 1.2%、前年 0.0%) 平年並
 m²当たり虫数 : 0.0頭 (平年 0.0頭、前年 0.0頭) 平年並

[防除上の注意]

- (1) 宮崎市田野町、都城市、三股町、川南町(茶業支場)に設置しているフェロモントラップ調査から、次の発蛾最盛期は8月下旬から9月上旬と予想される。
 (2) 防除適期は、発蛾最盛日から7～10日後である。



5 チャハマキ (並)





[予報の根拠]

- 1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率 : 0.0% (平年 0.6%、前年 0.0%) 平年並
 m²当たり虫数 : 0.0頭 (平年 0.1頭、前年 0.0頭) 平年並

[防除上の注意]

- (1) フェロモントラップ調査による前回の発蛾最盛期は、都城では7月第6半旬であった。次の発蛾最盛期は、9月上旬と予想される。
- (2) 通常チャノコカクモンハマキと同時に防除できるが、両種の発蛾最盛期が10日以上異なる場合は別に防除する。



6 チャノホソガ (並)



[予報の根拠]



1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率 : 11.8% (平年 23.0%、前年41.2%) 平年よりやや少
 m²当たり巻葉数 : 1.4葉 (平年 1.7葉、前年 4.5葉) 平年並

[防除上の注意]

- (1) 県内4か所に設置しているフェロモントラップ調査による前回の発蛾最盛期は7月下旬で、次の発蛾最盛期は8月下旬と予想される。
- (2) 例年9月以降は増加する傾向にあり、また、この時期は秋芽の伸長期であるので今後の発生に注意する。





7 カンザワハダニ (やや多)

[予報の根拠]

1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：41.2% (平年 37.1%、前年 41.2%) 平年よりやや多

寄生葉率：4.6% (平年 3.2%、前年 2.2%) 平年よりやや多

[防除上の注意]

- (1) 同一系統薬剤の連用を避け、作用性の異なる薬剤のローテーション散布を実施する。

8 チャノキイロアザミウマ (やや多)

[予報の根拠]

1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：76.5% (平年 53.6%、前年 70.6%) 平年よりやや多

寄生葉率：6.6% (平年 5.3%、前年 7.5%) 平年並

[防除上の注意]

- (1) この時期は卵・幼虫・蛹・成虫が混在し、卵と蛹には農薬がかかりにくく防除効果があがらないので、残効の長い農薬か1週間間隔での連続散布を行う。

9 チャノミドリヒメヨコバイ (やや多)

[予報の根拠]

1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：64.7% (平年 57.7%、前年 64.7%) 平年並

寄生葉率：7.2% (平年 3.9%、前年 3.5%) 平年より多

[防除上の注意]

- (1) チャノキイロアザミウマとの同時防除が可能である。

10 クワシロカイガラムシ (やや少)

[予報の根拠]

1) 8月中旬の巡回調査結果

発生面積率：17.6% (平年 33.5%、前年 23.6%) 平年よりやや少


寄生株率：2.9% (平年 14.7%、前年 14.1%) 平年よりやや少

[防除上の注意]

- (1) 防除適期は幼虫ふ化開始から1週間後または幼虫ふ化最盛期なので、ふ化状況をよく観察して防除する。
- (2) 薬剤散布量は、成木園で10a当たり1,000リットル程度を目安に、専用噴口を使うなどして枝幹に十分かかるようにていねいに散布する。

11 チャトゲコナジラミ

- (1) 県西部における黄色粘着トラップ調査では昨年と同様8月中旬に成虫の発生ピークを迎えると予想される。
- (2) 防除適期は成虫の発生がおさまる頃の若齢幼虫発生期のため、県西部では8月下旬～9月上旬と予想される。



○ 農薬危害防止運動

6月1日から8月31日は、農薬危害防止運動実施期間です。農薬の適正使用により、事故防止に努めましょう。

○ その他

- 1 農薬適用の有無などについては次のホームページで確認する。

宮崎県農薬安全使用啓発

<http://nouyaku-tekisei.pref.miyazaki.lg.jp/nouyaku/user/top/miyazaki>

日本植物防疫協会

<http://jppn.ne.jp>

農林水産省(農薬コーナー)

<http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/>

農林水産消費安全技術センター

<http://www.acis.famic.go.jp/>

- 2 農薬の使用に当たっては、農薬使用基準の遵守並びに危被害の発生防止に努める。

- 3 発生量(程度)の区分

多い	(高い)	やや多いの外側10%の度数の入る幅
やや多い	(やや高い)	平年並の外側20%の度数の入る幅
平年並		平年値を中心として40%の度数の入る幅
やや少ない	(やや低い)	平年並の外側20%の度数の入る幅
少ない	(低い)	やや少ないの外側10%の度数の入る幅
(平年値は過去10年間の平均)		

- 4 予察情報の種類

病虫害防除・肥料検査センターから発表する情報は次の5つです。

- (1) 予報・・・向こう1か月の発生状況を予測し、毎月25日前後に発表する。
- (2) 注意報・・・主要な病虫害の多発生が予想され、かつ早めに防除が必要な場合に発表する。
- (3) 警報・・・主要な病虫害の大発生が予想され、かつ緊急に防除が必要な場合に発表する。
- (4) 特殊報・・・県内で初めて発生を認めた病虫害がある時や、病虫害の発生様相が特異な時に発表する。
- (5) 防除情報・・・注意をうながす必要がある病虫害の発生状況や、各種の防除技術指導情報について随時発表する。

○ お知らせ

病虫害防除・肥料検査センターでは、ホームページで情報を提供しています。ホームページアドレスは<http://www.jppn.ne.jp/miyazaki/>です。

【文書取扱】

宮崎県病虫害防除・肥料検査センター 倉富

TEL:0985-73-6670 FAX:0985-73-2127

E-mail:byogaichu-hiryo@pref.miyazaki.lg.jp