

注 意 報

長崎県病害虫防除所長

平成28年度病害虫発生予察 注意報第3号



いちご ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダニ）

1. 発生地域（対象地域） 県内全域

2. 発生程度 多

3. 注意報発令の根拠

8月下旬の巡回調査（27筆）の結果、寄生株率12.4%（平年4.5%）、発生圃場率77.8%（平年47.5%）と寄生株率・発生圃場率ともに過去10カ年で最も高かった（図1、2）。



4. 防除対策

- (1) 本圃への持込みを避けるため、定植までの防除対策を徹底する。
- (2) 下葉の裏に多く寄生するので、薬液が葉裏に十分かかるように丁寧に散布する。特に「ゆめのか」は「さちのか」よりも茎葉が繁茂しやすく、農薬が葉裏まで十分かかりにくいいため注意する。
なお、古葉を摘葉後に防除すると効果的である。
- (3) 薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統の薬剤は連用しない。本県のいちごハダニ類の薬剤感受性に関する具体的なデータについては、病害虫防除所ホームページのいちごのナミハダニ薬剤感受性検定結果参照。
- (4) 薬剤感受性低下の恐れが少なく、土着天敵に影響の少ない気門封鎖剤を活用する場合、これらの薬剤は卵に対する効果が低いので5～7日おきに連続散布を行う。

長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせは、電話でお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

