

注 意 報

長崎県病害虫防除所長

令和4年度病害虫発生予察 注意報第1号

茶 チャノミドリヒメヨコバイ

1. 発生地域（対象地域） 県内全域

2. 発生程度 多

3. 注意報発令の根拠

5月前期の巡回調査（19筆）の結果、たたき落とし虫数（A4版トレイ）は11.3頭（平年2.1頭）、発生圃場率は89.5%（平年58.3%）であった（図1、2）。




図1 チャノミドリヒメヨコバイ寄生虫数




図2 チャノミドリヒメヨコバイ発生圃場率

4. 防除対策

- (1) 二番茶・三番茶の萌芽～開葉初期に重点的に防除を行う。
- (2) 中切り等の更新園、摘採中止園、幼木園などでは、茶芽生育期間が長いことため被害が継続し、樹勢へ及ぼす影響が大きいことから、特に注意する。
- (3) 薬剤抵抗性発達防止のため、同一系統（令和4年長崎県病害虫防除基準P430～433の「作用機構による分類（IRAC）」参照）の薬剤を連用しない。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

（長崎県病害虫防除所）ホームページ」アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

（長崎県病害虫防除所） TEL：0957-26-0027

