

注 意 報

長崎県病害虫防除所長

令和元年度病害虫発生予察 注意報第10号

いちご ハダニ類 (ナミハダニ、カンザワハダニ)

1. 発生地域 (対象地域) 県内全域

2. 発生程度 多

3. 注意報発令の根拠

- (1) 3月前期の巡回調査(26筆)の結果、寄生株率は13.9%(平年7.0%)、発生圃場率は61.5%(平年44.0%)と平年より高く推移している(図1、2)。
- (2) 気象予報(福岡管区气象台、令和2年3月12日発表)によると、向こう1か月の気温は平年より高い見込みであり、本虫の発生に好適である。




図1 いちご ハダニ類 寄生株率




図2 いちご ハダニ類 発生圃場率

4. 防除対策

- (1) 下葉の裏に多く寄生するので、薬液が葉裏に十分かかるように丁寧に散布する。
- (2) 古葉の摘葉後に防除すると効果的である。摘葉した葉を圃場内に放置すると周辺株へハダニ類が移動するため、速やかに取り除きビニール袋等に入れ圃場外へ持ち出す。
- (3) 薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統の薬剤(平成31年長崎県病害虫防除基準P220～223の「作用機構による分類(IRAC)」参照)を連用しない。
- (4) ミツバチへの影響がある薬剤については、影響日数を確認し薬剤散布を行う。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県病害虫防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027

