

平成20年7月15日

# 注 意 報

長崎県病害虫防除所長

平成20年度病害虫発生予察 注意報第2号

## ぶどう べと病

1. 発生地域（対象地域） 県下全域
2. 発生程度 多
3. 注意報発令の根拠
  - (1) 7月上旬の巡回調査（12筆）の結果、発病葉率6.8%（平年0.2%）、発生圃場率83.3%（平年9.4%）で、過去10年間で最も発生が多い。
  - (2) 6月中旬～下旬にかけて降水量が多く、本病の発生に好適であった。
4. 防除対策
  - (1) 本病は発病後2～3日後には葉裏の病斑上に白いカビが発生し、2次伝染を繰り返す。短期間に被害が拡大するので、薬剤防除を行っていない園では早急を実施する。
  - (2) 8月以降降雨が多い場合や、9月以降気温が低下すると発生が増加するので、収穫後も防除を徹底する。
  - (3) 収穫後も防除を徹底し、葉の早期落葉を防ぐ。また、感染した枝葉や落葉は感染源となるので、園外に持ち出し処分する。
  - (4) 収穫時期が迫っているので、農薬使用基準（特に使用時期）に注意する。



図1 べと病（葉表）



図2 べと病（葉裏）

---

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027