

# 防 除 情 報

長崎県病害虫防除所長

平成23年度病害虫発生予察防除情報第7号

## 大豆 ハスモンヨトウの防除対策について

ハスモンヨトウのフェロモントラップ（諫早市）の誘殺量が7月4半旬に増加し、今後、被害の増加が予想されますので下記の点に留意して防除指導をお願いします。

### 記

#### 1. 発生状況等

- (1) フェロモントラップ（諫早市）の誘殺量は、7月4半旬に増加した（図）。
- (2) 7月22日に県予察圃場（諫早市、無防除、7月11日播種）において、若齢幼虫の寄生を確認している。




図 ハスモンヨトウのフェロモントラップにおける誘殺状況(諫早市小船越)  
平年: H13 ~ H22の平均値(最大・小値除く)

#### 2. 防除対策

- (1) 圃場の見回りを徹底し、白変葉が散見されるようになったら早急に防除を行う。
- (2) 幼虫は齢が進むと薬剤の効果が低下するので若齢幼虫期に防除を行う。
- (3) 薬剤は虫体によくかかるよう丁寧に散布する。

6月1日から8月31日までの3ヶ月間を「農薬危害防止月間」と定め、農薬事故を防止する運動を実施しています。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

この情報に関するお問い合わせ

長崎県病害虫防除所 TEL: 0957-26-0027