注 意 報

平成２６年度病害虫発生予察注意報第１号

病害虫名　果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ・クサギカメムシ・ツヤアオカメムシ)
作物名　ウメ・モモ・ナシ・カキ・ブトウ・カンキツ

１．発生地域　県下全域

２．発生時期　５月～８月

３．発生程度　多い

４．注意報発表の根拠
（１）県内18カ所で実施したチャバネアオカメムシの越冬量調査の結果、越冬成虫はすべての調査地点で確認され、越冬量は平均24.3頭とカメムシ被害の多発年であった平成16年に次ぐ多さでした（図１）。
（２）５月13日にサクラ、クワ樹への寄生状況について巡回調査を行った結果、チャバネアオカメムシの寄生がほとんどの調査地点で確認され（寄生樹率90％）、調査地点における平均虫数も5.0頭と多くなっています（参考　平成16年の平均虫数：8.8頭）。

５．防除上の注意事項
（１）カメムシの飛来は気温と密接な関係があり、最低気温が高く、蒸し暑く感じる夜は特に注意が必要です。こまめに園地を見回り、新しい被害やカメムシを確認した場合は直ちに防除を行います。
（２）カメムシの飛来には園地間差が大きく、山際の園地や過去にカメムシ被害の多かった園地では特に注意します。
（３）飛来がない園での予防散布は効果が期待できず、天敵の減少によってカイガラムシ類、ハダニ類の増加につながるなど弊害が大きいので控えます。
（４）黄色灯を点灯できる圃場は早急に点灯します。ただし、チャバネアオカメムシ以外には効果がないので、光源近くや園内でクサギカメムシやツヤアオカメムシが目立つ場合は薬剤防除が必要です。また、電撃殺虫器、果樹園に面した蛍光灯などの光源はカメムシを誘引するので、できる限り消灯します。
（５）５月～６月は、ウメおよびナシ、モモの幼果が被害を受けやすく、ナシ、モモの有袋栽培では袋かけを早めに終えるようにします。カキ園には６月下旬（幼果期）以降飛来が多くなります。今後の予察情報に十分注意します。
（６）農薬散布時には隣接する農作物に飛散しないように十分注意します。また、農薬使用前にはラベルをよく読み記載された使用条件を遵守します。



図1　チャバネアオカメムシ越冬量の年次変動

表1　カメムシ類の主な防除薬剤

	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
ウメ	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	収穫3日前まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	スカウトフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
モモ	スミチオン乳剤	1000倍	収穫3日前まで	6回以内	有機リン剤
	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アドマイヤー顆粒水和剤	10000倍	収穫3日前まで	2回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アグロスリン水和剤	2000倍	収穫前日まで	5回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
	テルスターフロアブル	3000倍	収穫前日まで	2回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
ナシ	スミチオン水和剤40	800～1000倍	収穫21日前まで（無袋） 収穫14日前まで（有袋）	6回以内	有機リン剤
	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アドマイヤー顆粒水和剤	5000～10000倍	収穫3日前まで	2回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アグロスリン水和剤	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
	アディオン乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
	アーデント水和剤	1000倍	収穫7日前まで	3回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
カキ	スミチオン水和剤40	800～1000倍	収穫45日前まで	3回以内	有機リン剤
	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アドマイヤー顆粒水和剤	5000～10000倍	収穫7日前まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アグロスリン水和剤	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
	MR.ジョーカー水和剤	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
	キラップフロアブル	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	ﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗｿﾞｰﾙ系
ブドウ	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	ダントツ水溶剤	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
カンキツ	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アドマイヤー顆粒水和剤	5000～10000倍	収穫14日前まで	3回以内	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ剤
	アグロスリン水和剤	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤
	テルスターフロアブル	3000～6000倍	収穫前日まで	3回以内	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ剤

注）登録内容はH.26.5.1時点のものです。農薬使用前にはラベルをよく読み、記載された使用条件を遵守して下さい。