

オクラ

—— 発病・加害時期
 === 発病・加害最盛期

作型・病虫害名		月											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
普	通				●	▲	—	■					
					は種	定植		収穫					
疫	病												
う	ど												
ア	ブ												
フ	タ												
ハ	ス												
オ	オ												
カ	メ												
	ム												
	シ												
	コ												
	シ												
	ヤ												
	ト												
	コ												
	ガ												
	シ												

疫病

留意事項

- 1 梅雨後期など多雨で発生が多い。
- 2 QoI剤 (11) は、耐性菌が出現しやすいので、1作1回程度の使用に努める。

防除方法

- 1 連作を避ける。
- 2 定植時、株元を高くして浸冠水を避け、排水に努める。
- 3 わらやポリフィルムでマルチングする。
- 4 肥料切れしないように肥培管理に注意する。
- 5 被害株を早めに抜きとり、ほ場外へ持ち出し処分する。
- 6 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [ユニフォーム粒剤](#) 4 (11) 【9kg/10a 株元散布 前日/3回】

うどんこ病

留意事項

- 1 QoI剤 (11) は、耐性菌が出現しやすいので、1作1回程度の使用に努める。

防除方法

- 1 窒素質肥料の多用を避ける。
- 2 高温乾燥時に発病しやすい。また、生育後半に発病しやすい。
- 3 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [アミスター20フロアブル](#) (11) 【2,000倍 前日/2回】
 - ・ [モレスタン水和剤](#) M10 【3,000倍 前日/3回】

- ・ [トリフミン水和剤](#) 3 【5,000倍 前日／3回】
- ・ [アフエットフロアブル](#) 7 【2,000倍 前日／3回】

アブラムシ類

留意事項

- 1 薬剤抵抗性が生じやすいので、同一系統薬剤の連用を避け、ローテーション散布を行う。

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を施用する。
 - ・ [スタークル粒剤](#)、[アルバリン粒剤](#) 4 A
【9kg／10a 株元散布 生育期（収穫開始14日）／1回】
- 2 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [コルト顆粒水和剤](#) 9 B 【4,000倍 前日／3回】
 - ・ [トレボン乳剤](#) 3 A 【1,000倍 前日／3回】
 - ・ [ベネビアOD](#) 2 8 【2,000倍 3日／3回】
 - ・ [モスピラン顆粒水溶剤](#) 劇 4 A 【4,000倍 前日／3回】
 - ・ [ウララDF](#) 2 9 【2,000倍 前日／3回】

ハスモンヨトウ

留意事項

- 1 薬剤抵抗性が生じやすいので、同一系統薬剤の連用を避け、ローテーション散布を行う。

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ B T 剤 1 1 A（IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照）
 - ・ [プレオフロアブル](#) UN 【1,000倍 前日／2回】
 - ・ [コテツフロアブル](#) 劇 1 3 【2,000倍 前日／2回】
 - ・ [カスケード乳剤](#) 1 5 【2,000～4,000倍 前日／2回】
 - ・ [アディオン乳剤](#) 3 A 【2,000倍 前日／3回】
 - ・ [プレバソンフロアブル5](#) 2 8 【2,000倍 前日／3回】

オオタバコガ

留意事項

- 1 チョウ目幼虫の加害には、フタトガリコヤガ、ワタノメイガ等があるが、合わせて捕殺を行う。
- 2 薬剤抵抗性が生じやすいので、同一系統薬剤の連用を避け、ローテーション散布を

行う。

防除方法

- 1 幼虫の捕殺は、被害軽減効果大きい。
- 2 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ B T 剤 1 1 A (IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照)
 - ・ [アフーム乳剤](#) 6 【2,000倍 前日/2回】
 - ・ [コテツフロアブル](#) 劇 1 3 【2,000倍 前日/2回】
 - ・ [プレオフロアブル](#) UN 【1,000倍 前日/2回】
 - ・ [プレバソンフロアブル5](#) 2 8 【2,000倍 前日/3回】

カメムシ類

防除方法

- 1 周辺の雑草から飛来し加害する種もあるので、生育初期から除草を行う。
- 2 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [トレボン乳剤](#) 3 A 【1,000倍 前日/3回】
 - ・ [アディオン乳剤](#) 3 A 【2,000倍 前日/3回】