

かぶ

農薬取締法上「かぶ」は、「非結球あぶらな科葉菜類」には含まれない。葉を食用とする場合も、必ず「かぶ」か「根菜類」、「野菜類」に適用のある農薬を使用すること。

—— 発病・加害時期
 === 発病・加害最盛期

作型・病害虫名	月											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
夏まき								●	●	■		
晩夏～秋まき								●	●	■		
秋まき									●	■		
根こぶ病 キスジノミハムシ ネキリムシ コナガ カブラハバチ(ナノクロムシ) ヨトウムシ アブラムシ類								—	—	—		

根こぶ病

留意事項

- 1 作条施用は、土壌と良く攪拌する。

防除方法

- 1 あぶらな科野菜の連作を避ける。
- 2 排水を良好にする。
- 3 石灰質資材を施用し、土壌酸度を矯正する。
- 4 発病根は、ほ場外へ持ち出し処分する。
- 5 発病の恐れのある場合には、下記の薬剤を施用する。

・ [ネビリュウ](#) 36

【全面土壌混和 30kg/10a は種前/1回】または

【作条土壌混和 20kg/10a は種前/1回】

・ [フロンサイド粉剤](#) 29 【全面土壌混和 30~40kg/10a は種又は定植前/1回】

・ [ランマンフロアブル](#) 21 【かん注 2,000倍 は種時/1回】

- 6 下記の薬剤で土壌消毒を行う。(XⅢ土壌消毒 参照)

・ [バスアミド微粒剤](#)、[ガスタード微粒剤](#) 劇 一

【20~30kg/10a は種または定植21日前/1回】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

キスジノミハムシ

防除方法

- 1 は種時に下記の薬剤を施用する。
 - ・ [フォース粒剤](#) 劇 [3 A](#) 【4kg/10a まき溝土壌混和 は種時/1回】
 - ・ [スタークル粒剤](#)、[アルバリン粒剤](#) [4 A](#) 【6kg/10a まき溝土壌混和 は種時/1回】
- 2 成虫に対して下記の薬剤を散布する。
 - ・ [アクセルフロアブル](#) [2 2 B](#) 【1,000倍 3日/2回】
 - ・ [ブロフレアSC](#) [3 0](#) 【2,000~4,000倍 前日/3回】

ネキリムシ類

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を施用する。
 - ・ [ダイアジノン粒剤5](#) [1 B](#) 【6kg/10a 土壌表面散布 出芽時/1回】

コナガ

留意事項

- 1 薬剤抵抗性が生じやすいので、同一系統薬剤の連用を避け、ローテーション散布を行う。

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [BT剤](#) [1 1 A](#) (IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照)
 - ・ [ディアナSC](#) [5](#) 【2,500~5,000倍 前日/2回】
 - ・ [アフーム乳剤](#) [6](#) 【2,000倍 3日/2回】
 - ・ [コテツフロアブル](#) 劇 [1 3](#) 【2,000倍 前日/2回】
 - ・ [アクセルフロアブル](#) [2 2 B](#) 【1,000倍 3日/2回】

カブラハバチ

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [マラソン乳剤](#) [1 B](#) 【1,000倍 14日/4回】
 - ・ [モスピラン顆粒水溶剤](#) 劇 [4 A](#) 【4,000倍 21日/1回】

ヨトウムシ類

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [ディアナSC](#) [5](#) 【ハスモンヨトウ 2,500~5,000倍 前日/2回】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

- ・ **BT剤** 1 1 A (IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照)
- ・ **プレオフロアブル** UN 【ハスモンヨトウ 1,000倍 3日/2回】
- ・ **コテツフロアブル** 劇 1 3 【ヨトウムシ 2,000倍 前日/2回】

アブラムシ類

防除方法

1 は種時に下記の薬剤を施用する。

- ・ **アドマイヤー1粒剤** 4 A 【4kg/10a まき溝土壌混和 は種時/1回】

2 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。

- ・ **スタークル顆粒水溶剤**、**アルバリン顆粒水溶剤** 4 A 【3,000倍 3日/2回】
- ・ **モスピラン顆粒水溶剤** 劇 4 A 【2,000倍 21日/1回】
- ・ **マラソン乳剤** 1 B 【2,000~3,000倍 14日/4回】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。