

くわい

—— 発病・加害時期
 == 発病・加害最盛期

作型・病害虫名		月											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
普	通						▲ 種球植付け						■ 収穫
赤	枯						—	—	—	—			
ひ	ぶ						—	—	—	—			
茎	腐						—	—	—	—			
ア	ブ						—	—	—	—			
ハ	ス								—	—	—		
	ム												
	シ												
	類												
	ウ												

赤枯症（フザリウム菌）

防除方法

- 1 種いもは無病のものを選ぶ。
- 2 種いもを貯蔵前に下記の薬剤に30分間浸漬する。
 - ・ [ベンレートT水和剤20](#) 1 M 3 【300倍 種いも貯蔵前／1回】

ひぶくれ病

留意事項

- 1 台風などで茎葉に傷を生じた場合に発生しやすい。

防除方法

- 1 被害葉は早めに摘除し、胞子球の飛散を防ぐ。
- 2 発生が見込まれる時期に、下記の薬剤を予防的に散布する。
 - ・ [Zボルドー](#) M 1 【500倍 —／—】
 - ・ [コサイド3000](#) M 1 【2,000倍 —／—】

茎腐病

防除方法

- 1 発生を認めたら、下記の薬剤をたん水散布する。
 - ・ [ユニフォーム粒剤](#) 4 1 1 【3kg／10a 21日／2回】

アブラムシ類

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [スタークル粒剤](#)、[アルバリン粒剤](#) 4 A 【3kg／10a 30日／3回】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

- ・ [ダントツ粒剤](#) 4 A 【たん水散布 6kg/10a 7日/3回】
- ・ [アドマイヤーフロアブル](#) 劇 4 A 【4,000倍 21日/3回】
- ・ [ウララDF](#) 2 9 【2,000倍 21日/3回】

ハスモンヨトウ

留意事項

- 1 パダンSG水溶剤は、眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [パダンSG水溶剤](#) 劇 1 4 【1,500倍 30日/3回】
 - ・ [BT剤](#) 1 1 A (IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照)

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。