


にんじん

農薬取締法上「にんじん」は根を食用するものに限られるため、「にんじん」または「根菜類」、「野菜類」に適用のある農薬を使用すること。

葉を食用にする「にんじん（葉）」については、「にんじん（葉）」または「根菜類」「野菜類」に適用のある農薬を使用すること。ただし、「にんじん（葉）」は平成31年4月に「せり科葉菜類」から「根菜類」に分類が変更されたが、既に「せり科葉菜類」に登録のある農薬（※）は、「にんじん（葉）」（専用栽培）に使用可能。

（※）D-D 剤、イミダクロプリド水和剤、クロラントラニリプロール水和剤、フルフェノクスロン乳剤、ミルベメクテン乳剤（令和元年7月末現在）



黒葉枯病

留意事項

- 1 高温乾燥時に発生しやすい。
- 2 QoI剤 (11)、SDHI剤 (7) は、耐性菌が出現しやすいので、1作1回程度の使用に努める。

防除方法

- 1 排水を良好にする。
- 2 収穫後は、被害茎葉を集めて、ほ場外へ持ち出し処分する。
- 3 発生が見込まれる時期に、下記の薬剤を予防的に散布する。
 - ・ [ダコニール1000](#) M5 【1,000倍 7日／5回】
 - ・ [ベルコート水和剤](#) M7 【500～1,000倍 14日／5回】
 - ・ [Zボルドー](#) M1 【500～800倍 —／—】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

4 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。

- ・ [アリエッティ水和剤](#) P 7 【800倍 7日／3回】
- ・ [ロブラール水和剤](#) 2 【1,000～1,500倍 14日／4回】
- ・ [ファンタジスタ顆粒水和剤](#) 1 1 【3,000倍 3日／3回】
- ・ [カンタスドライフロアブル](#) 7 【1,000～1,500倍 14日／3回】

黒斑病

留意事項

- 1 夏～秋に降雨が続くと発生する。
- 2 収穫物に罹病根が混入すると、貯蔵中に接触伝染により蔓延する。

防除方法

- 1 排水を良好にする。
- 2 肥切れさせない。
- 3 発生が見込まれる時期に、下記の薬剤を予防的に散布する。
 - ・ [ダコニールエース](#) M 5 【750倍 7日／5回】

キアゲハ

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [コテツフロアブル](#) 劇 1 3 【2,000倍 前日／2回】
 - ・ [モスピラン顆粒水溶剤](#) 劇 4 A 【4,000倍 前日／3回】
 - ・ [ベネビアOD](#) 2 8 【4,000倍 前日／3回】

ハスモンヨトウ

留意事項

- 1 老齢幼虫への効果は劣るので、若齢期の防除に重点を置く。
- 2 薬剤抵抗性が生じやすいので、同一系統薬剤の連用を避け、ローテーション散布を行う。

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [プレオフロアブル](#) UN 【1,000倍 前日／2回】
 - ・ [アクセルフロアブル](#) 2 2 B 【1,000倍 前日／3回】
 - ・ [ディアナSC](#) 5 【2,500～5,000倍 前日／2回】
 - ・ [ベネビアOD](#) 2 8 【4,000倍 前日／3回】
 - ・ [BT剤](#) 1 1 A (IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照)

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

ヨトウムシ

留意事項

- 1 老齢幼虫への効果は劣るので、若齢期の防除に重点を置く。

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [フェニックス顆粒水和剤](#) 28 【2,000～4,000倍 前日／2回】
 - ・ [コテツフロアブル](#) 劇 13 【2,000倍 前日／2回】
 - ・ [カスケード乳剤](#) 15 【4,000倍 3日／2回】
 - ・ [BT剤](#) 11A (Ⅸ野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照)

アブラムシ類

防除方法

- 1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
 - ・ [モスピラン顆粒水溶剤](#) 劇 4A 【4,000倍 前日／3回】
 - ・ [スタークル顆粒水溶剤](#)、[アルバリン顆粒水溶剤](#) 4A 【2,000倍 7日／2回】
 - ・ [ベネビアOD](#) 28 【2,000倍 前日／3回】
 - ・ [マラソン乳剤](#) 1B 【2,000～3,000倍 14日／4回】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。