

## みつば

—— 発病・加害時期  
 === 発病・加害最盛期

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冬／夏まきハウス	↑ (冬)		↑			↑ (夏)		↑				
春／秋まきハウス		↑ (秋)		↑ (春)		↑				↑ (秋)		
ハウス周年（水耕栽培）	↑					ハウスは種定植収穫						↑
べと病（ハウス）												
灰色かび病												
立枯病（水耕）												
菌核病												
根腐病												
ハダニ類												
アブラムシ類												
ハスモンヨトウ												

## べと病

### 留意事項

- 1 ハウス栽培では、多発すると周年発生する。初期に防除を徹底する。

### 防除方法

- 1 連作を避ける。
- 2 被害株は早めに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。
- 3 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
  - ・ [ランマンフロアブル](#) **21** 【2,000倍 3日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／2回】
  - ・ [アリエッティ水和剤](#) **P7** 【1,000倍 14日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／2回】

## 灰色かび病

### 留意事項

- 1 株元の古葉から発生しやすいので注意して観察する。
- 2 アミスター20フロアブルは、浸透性を高める展着剤を加用しない（薬害）。  
 QoI剤 (**11**) は、耐性菌が生じやすいので、1作1回程度の使用に努める。

### 防除方法

- 1 被害株は早めに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

2 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。

- ・ [アミスター20フロアブル](#) 1 1  
 【2,000倍 14日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／1回】
- ・ [スミブレンド水和剤](#) 2 1 0 【2,000倍 21日／1回】
- ・ [エコショット](#) BM 2 【野菜類 1,000～2,000倍 前日／—】

## 立枯病

### 留意事項

- 1 5月上旬～6月下旬、9月下旬～10月中旬に発生が多い。
- 2 SDHI剤（7）は、耐性菌が生じやすいので、1作1回程度の使用に努める。
- 3 「みつば」で使用する場合、リゾレックス粉剤及びリゾレックス水和剤の成分トルクロホスメチルの総使用回数は、2回以内（は種前の土壌混和は1回以内）。また、「みつば（水耕栽培）」で使用する場合、成分トルクロホスメチルの総使用回数は1回。

### 防除方法

- 1 感染苗を定植しない。
- 2 発生の恐れのある場合は、下記の薬剤をは種前に施用する。
  - ・ [リゾレックス粉剤](#) 1 4 【20kg／10a 全面土壌混和 は種前／1回】
- 3 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
  - ・ [バリダシン液剤5](#) U 1 8  
 【800倍 育苗期／1回】  
 【800倍 移植後（7日、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／3回】
  - ・ [モンカット水和剤](#) 7 【水耕栽培 1,000倍 30日／1回】
  - ・ [リゾレックス水和剤](#) 1 4 【水耕栽培 1,000倍 育苗期(40日)／1回】

## 菌核病

### 留意事項

- 1 ベンレート水和剤の成分ベノミルの総使用回数は、1回以内。

### 防除方法

- 1 被害株は早めに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。
- 2 は種前に、下記の薬剤で種子消毒する。
  - ・ [ベンレート水和剤](#) 1  
 【種子重量の0.5% 種子粉衣 は種前／1回】または  
 【500倍 24時間種子浸漬 は種前／1回】
- 3 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。
  - ・ [トップジンM水和剤](#) 1 【2,000倍 14日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／2回】

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。



行う。

#### 防除方法

1 発生を認めたら下記の薬剤を散布する。

- ・ [アファーム乳剤](#) 6 【2,000倍 7日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／2回】
- ・ [スピノエース顆粒水和剤](#) 5  
【5,000倍 7日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／2回】
- ・ [コテツフロアブル](#) 劇 13  
【2,000倍 14日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／1回】
- ・ [マトリックフロアブル](#) 18  
【2,000倍 7日（伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）／2回】
- ・ B T 剤 11A（IX野菜類の病害虫防除 3野菜類 参照）

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。