

### 3 野菜類

農薬取締法上、「とうもろこし」は野菜類に含まれないので注意する。

病害虫名	作物名	農薬名	希釈倍数 使用量	使用方法および 使用時期／使用回数
うどんこ病	野菜類	アカリタッチ乳剤 <input type="checkbox"/>	2,000 倍	前日／－
		ハーモメイト水溶剤 <input type="checkbox"/> NC	800～1,000 倍	前日／－
		ボトキラー水和剤 <input type="checkbox"/> BM2	1,000 倍	発病前～発病初期／－
			15g/10a/日	ダクト内投入 発病前～発病初期／－
		フーモン <input type="checkbox"/>	1,000 倍	前日／－
		アーリーセーフ <input type="checkbox"/>	300～600 倍	前日／－
	サンクリスタル乳剤 <input type="checkbox"/>	300～600 倍	前日／－	
	野菜類 (除すいか、かぼちゃ、いちご)	イオウフロアブル <input type="checkbox"/> M2	500～1,000 倍	発病前～発病初期／－ ※メーカーにより登録 が異なるので注意
	すいか、かぼちゃ		500 倍	
	いちご		2,000 倍	
			500～1,000 倍	親株床初期／－
	野菜類	カリグリーン <input type="checkbox"/> NC	800～1,000 倍	前日／－
		バイオワーク水和剤 <input type="checkbox"/> BM2	1,000 倍	発病前～発病初期／－
			インプレッション水和剤 <input type="checkbox"/> BM2	500～1000 倍
				500 倍(上澄液)
	野菜類 (除なす)	ジーファイン水和剤 <input type="checkbox"/> M1 <input type="checkbox"/> NC	750～1,000 倍	前日／－
	なす		1,000～2,000 倍	前日／－
	野菜類 (除トマト、ミニトマト、きゅうり、なす)	エコピタ液剤 <input type="checkbox"/>	100 倍	前日／－
	トマト、ミニトマト、きゅうり、なす		100～200 倍	前日／－
	野菜類	ボタニガード ES <input type="checkbox"/> (UNF)	1,000 倍	発病前～発病初期／－
		粘着くん液剤 <input type="checkbox"/>	100 倍	前日／－
サフオイル乳剤 <input type="checkbox"/>		300 倍	前日／－	
野菜類 (施設栽培)	ゴッツ A <input type="checkbox"/> (生)	500 倍	発病前～発病初期／－	

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

病害虫名	作物名	農薬名	希釈倍数 使用量	使用方法および 使用時期／使用回数
褐斑細菌病	野菜類	<a href="#">コサイド3000</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	2,000倍	—／—
		<a href="#">コサイドDF</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	1,000倍	—／—
	野菜類 (除キャベツ)	<a href="#">Zボルドー</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	500倍	—／—
黒腐病	野菜類	<a href="#">コサイド3000</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	2,000倍	—／—
		<a href="#">コサイドDF</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	1,000倍	—／—
	野菜類 (除キャベツ)	<a href="#">Zボルドー</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	500倍	—／—
	キャベツ	<a href="#">Zボルドー</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	500～1,000倍	—／—
さび病	野菜類	<a href="#">カリグリーン</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NC</span>	800倍	前日／—
		<a href="#">ハーモメイト水溶剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NC</span>	800倍	前日／—
白さび病	野菜類 (除なす)	<a href="#">ジーファイン水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NC</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	1,000倍	前日／—
軟腐病	野菜類	<a href="#">ドイツボルドーA</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	500～1,000倍	—／—
		<a href="#">コサイド3000</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	2,000倍	—／—
		<a href="#">コサイドDF</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	1,000倍	—／—
		<a href="#">Zボルドー</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	500～1,000倍	—／—
		<a href="#">クプロシールド</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	1,000～1,500倍	—／—
	野菜類 (除かぼちゃ、ズッキーニ)	<a href="#">バイオキーパー水和剤</a> —(生)	500～2,000倍	発病前～発病初期／—
	野菜類 (除なす)	<a href="#">ジーファイン水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NC</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</span>	1,000倍	前日／—
灰色かび病	野菜類	<a href="#">ハーモメイト水溶剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NC</span>	800倍	前日／—
		<a href="#">ボトキラー水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BM2</span>	1,000倍	発病前～発病初期／—
			300g/10a	常温煙霧 発病前～発病初期／—
			10～15g/10a/日	ダクト内投入 発病前～発病初期／—
		<a href="#">エコショット</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BM2</span>	1,000～2,000倍	前日／—
		<a href="#">カリグリーン</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NC</span>	800倍	前日／—
		<a href="#">バイオワーク水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BM2</span>	1,000倍	発病前～発病初期／—
		<a href="#">インプレッション水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BM2</span>	500～1,000倍	発病前～発病初期／—

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

病害虫名	作物名	農薬名	希釈倍数 使用量	使用方法および 使用時期／使用回数
斑点細菌病	野菜類	<a href="#">コサイド3000</a> <input type="checkbox"/> M1	500倍(上澄液) 2,000倍	発病前～発病初期／－ －／－
		<a href="#">Zボルドー</a> <input type="checkbox"/> M1	500倍	－／－
		<a href="#">クプロシールド</a> <input type="checkbox"/> M1	1,000～2,000倍	－／－
黒斑細菌病	野菜類	<a href="#">Zボルドー</a> <input type="checkbox"/> M1	500倍	－／－
べと病	野菜類	<a href="#">ドイツボルドーA</a> <input type="checkbox"/> M1	500～1,000倍	－／－
		<a href="#">Zボルドー</a> <input type="checkbox"/> M1	500倍	－／－
		<a href="#">クプロシールド</a> <input type="checkbox"/> M1	1,000～2,000倍	－／－
アオムシ (モンシロチョウ)	野菜類	<a href="#">バシレックス水和剤</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">エスマルクDF</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">トアローフロアブルGT</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">トアロー水和剤GT</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">フローバックDF</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">デルフィン顆粒水和剤</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
	野菜類 (除はくさい)	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> <input type="checkbox"/> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
はくさい		2,000倍	発生初期 前日／－	
アザミウマ類	野菜類	<a href="#">ボタニガードES</a> <input type="checkbox"/> (UNF)	1,000倍	発生初期／－
	野菜類 (露地栽培)	<a href="#">スワルスキー</a> <input type="checkbox"/> (生)	250～500ml/10a (約 25,000～ 50,000頭/10a)	発生直前～発生初期／ －
	野菜類 (施設栽培)			
アブラムシ類	野菜類	<a href="#">粘着くん液剤</a> <input type="checkbox"/>	100倍	前日／－
		<a href="#">フーモン</a> <input type="checkbox"/>	1,000倍	前日／－
		<a href="#">ボタニガードES</a> <input type="checkbox"/> (UNF)	1,000倍	発生初期／－
		<a href="#">オレート液剤</a> <input type="checkbox"/>	100倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">エコピタ液剤</a> <input type="checkbox"/>	100倍	前日／－
		<a href="#">アーリーセーフ</a> <input type="checkbox"/>	300倍	前日／－
		<a href="#">サンクリスタル乳剤</a> <input type="checkbox"/>	300倍	前日／－
	<a href="#">サフオイル乳剤</a> <input type="checkbox"/>	300～500倍	前日／－	
野菜類 (施設栽培)	<a href="#">ゴッツA</a> <input type="checkbox"/> (生)	500倍	発生初期／－	

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

病害虫名	作物名	農薬名	希釈倍数 使用量	使用方法および 使用時期／使用回数
ウリノメイ ガ	野菜類	<a href="#">デルフィン顆粒水和剤</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
	うり科野菜類	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
オオタバコ ガ	野菜類	<a href="#">エスマルク DF</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">フローバック DF</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">デルフィン顆粒水和剤</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">トアローフロアブル CT</a> 11A	500～1,000倍	発生初期 前日／－
	野菜類 (除はくさい)	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
コナガ	野菜類	<a href="#">バシレックス水和剤</a> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">エスマルク DF</a> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">フローバック DF</a> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">トアローフロアブル CT</a> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">トアロー水和剤 CT</a> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">デルフィン顆粒水和剤</a> 11A	1,000倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">ポタニガード ES</a> (UNF)	500倍	発生初期／－
	野菜類 (除はくさい)	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> 11A	1,000～2,000倍	発生初期 前日／－
	はくさい		2,000倍	発生初期 前日／－
	コナジラミ 類	野菜類	<a href="#">ポタニガード ES</a> (UNF)	1,000倍
<a href="#">粘着くん液剤</a> ー			100倍	前日／－
<a href="#">フーモン</a> ー			1,000倍	前日／－
野菜類 (施設栽培)		<a href="#">マイコタール</a> ー	1,000倍	発生初期／－
		<a href="#">ゴッツ A</a> ー(生)	500～1,000倍	発生初期／－
		<a href="#">スワルスキー</a> ー(生)	250～500ml/10a (約 25,000～ 50,000頭/10a)	発生直前～発生初期 ／－
野菜類		<a href="#">サフオイル乳剤</a> ー	300倍	前日／－

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

病害虫名	作物名	農薬名	希釈倍数 使用量	使用方法および 使用時期／使用回数
コナジラミ 類	野菜類	<a href="#">オレート液剤</a> <input type="checkbox"/>	100～300 倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">エコピタ液剤</a> <input type="checkbox"/>	100～200 倍	前日／－
		<a href="#">アーリーセーフ</a> <input type="checkbox"/>	300 倍	前日／－
		<a href="#">サンクリスタル乳剤</a> <input type="checkbox"/>	300 倍	前日／－
シロイチモ ジヨトウ	野菜類	<a href="#">デルフィン顆粒水和剤</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	1,000 倍	発生初期 前日／－
	野菜類 (除はくさい)	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	1,000 倍	発生初期 前日／－
タマナギンウ ワバ	野菜類	<a href="#">バシレックス水和剤</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	1,000 倍	発生初期 前日／－
チャノホコリ ダニ	野菜類 (施設栽培)	<a href="#">スワルスキー</a> <input type="checkbox"/> (生)	250～500ml/10a (約 25,000～ 50,000 頭/10a)	発生直前～発生初期 ／－
	野菜類	<a href="#">サフオイル乳剤</a> <input type="checkbox"/>	300 倍	前日／－
ナメクジ類	野菜類	<a href="#">クプロシールド</a> <input type="checkbox"/> M 1	1,000 倍	発生前～発生初期／ －
ハスモンヨ トウ	野菜類	<a href="#">バシレックス水和剤</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	500 倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">デルフィン顆粒水和剤</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	1,000 倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">フローバック DF</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	1,000 倍	発生初期 前日／－
	野菜類 (除はくさい)	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> <input type="checkbox"/> 1 1 A	1,000 倍	発生初期 前日／－
ハダニ類	野菜類	<a href="#">粘着くん液剤</a> <input type="checkbox"/>	100 倍	前日／－
		<a href="#">アカリタッチ乳剤</a> <input type="checkbox"/>	1,000～3,000 倍	前日／－
		<a href="#">フーモン</a> <input type="checkbox"/>	1,000 倍	前日／－
		<a href="#">ボタニガード ES</a> <input type="checkbox"/> (UNF)	1,000 倍	発生初期／－
		<a href="#">スパイカル EX</a> <input type="checkbox"/> (生)	100～1,250ml/10a (約2,000～25,000 頭)または、20～ 3,000 頭/100 株	発生初期／－
		<a href="#">エコピタ液剤</a> <input type="checkbox"/>	100 倍	前日／－
		<a href="#">アーリーセーフ</a> <input type="checkbox"/>	300～600 倍	前日／－
		<a href="#">サンクリスタル乳剤</a> <input type="checkbox"/>	300～600 倍	前日／－
		<a href="#">サフオイル乳剤</a> <input type="checkbox"/>	300～500 倍	前日／－

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

病害虫名	作物名	農薬名	希釈倍数 使用量	使用方法および 使用時期／使用回数
ハダニ類	いちご	<a href="#">サフオイル乳剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">M1</span>	300 倍	定植前(2～10 秒間苗浸漬)／－
ヨトウムシ	野菜類	<a href="#">バシレックス水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">11A</span>	500 倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">エスマルク DF</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">11A</span>	1,000 倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">フローバック DF</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">11A</span>	1,000 倍	発生初期 前日／－
		<a href="#">トアロー水和剤 CT</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">11A</span>	500～1,000 倍	発生初期 前日／－
	野菜類 (除はくさい)	<a href="#">ゼンターリ顆粒水和剤</a> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">11A</span>	1,000～2,000 倍	発生初期 前日／－
	はくさい	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">11A</span>	2,000 倍	発生初期 前日／－

【近接散布、薬害等に関する注意事項】

1. 薬剤名の後にM1とある剤は、無機銅を有効成分とする剤です。無機銅剤はきゅうり、メロンなどのうり類、はくさい、キャベツなどのあぶらな科野菜、レタスに薬害を生じやすいので、下記の事項に十分注意してください。
  - ・ 幼苗期は特に発生しやすいので、中期以降に散布すること。
  - ・ 高温時の散布は症状が激しくなることがあるので避けること。
  - ・ 連続散布すると葉の周辺が黄化したり硬化したりすることがあるので、過度の連用を避けること。
  - ・ 炭酸カルシウム剤(クレフノン)の所定量の添加は薬害軽減に有効であるが、収穫間際には収穫物に汚れを生じるので留意すること。
2. 微生物を有効成分とする剤は、他剤と混用すると十分に効果が発揮されない場合があるので注意してください。
3. Zボルドーは、石灰硫黄合剤等アルカリ性薬剤との混用は避けること。
4. ジーファイン水和剤は、ジチオカーバメート系の薬剤(ジマンダイセン、ペンコゼブ等)との混用、近接散布は効果・薬害の点で問題があるので避けること。
5. サンクリスタル乳剤
  - ・ なす、ピーマン、はくさい、チンゲンサイ等に使用する場合、幼苗期には葉先枯れを生じることがあるので使用を避けること。また、あぶらな科葉菜類には薬害の恐れが高いため、一部に部分的に散布する等、事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。
  - ・ オーソサイド水和剤 80 およびストロビルリン系薬剤(アミスター20フロアブル、ストロビーフロアブル、アミスターオプティフロアブル)との混用・近接散布は避けること。特にストロビルリン系薬剤との近接散布は2週間以上あけること。
6. カリグリーン
  - ・ ベンレート水和剤、アリエッティ水和剤、アリエッティC水和剤、強酸性葉面散布剤との混用は避けること。
  - ・ メロンに使用する場合、葉に軽微な褐点、もしくは軽い縮葉症状を生じることがあるので留意すること。
7. ハーモメイト水溶剤
  - ・ 本剤は弱アルカリ性のため、強酸性の薬剤やアルカリ性剤と混用できない農薬との混用は避けること。

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。

8. イオウフロアブル

- ・ ボルドー液など、アルカリ性薬剤との混用は避けること。
- ・ 夏期高温期の散布は薬害を生じる恐れがあるので避けること。

9. オレート液剤

- ・ 本葉 6～7 枚期までの散布は、薬害を生じる恐れがあるので避けること。
- ・ 本剤はアルカリ性剤のため、他剤との混用または近接散布は避けること。

10. 粘着くん液剤

- ・ 水なすに使用する場合、果実に薬害を生じる恐れがあるので、果実がある時期は使用を避けること。
- ・ ボルドー液散布後に本剤を散布すると、薬害を生じる恐れがあるので使用を避けること。

---

注1：同じ農薬名でも、メーカーにより登録内容が異なる場合があるので、使用時には登録を確認してください。

注2：異なる農薬名でも、同一成分を含む場合があるので、成分の総使用回数はラベルで確かめて使用してください。