

(画像参考)同じ病原菌の病害

	学名	にら	ねぎ	たまねぎ
糸状菌	<i>Puccinia allii</i>	さび病		
	<i>Alternaria porri</i>	—	黒斑病	
	<i>Pleospora herbarum</i>	—	葉枯病	
	<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	乾腐病	萎凋病	乾腐病
	<i>Sclerotium rolfsii</i> Saccardo	白絹病		
	<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn	葉腐病	苗立枯病	
	<i>Phytophthora porri</i> Foister	白色疫病		
	<i>Botrytis byssoidea</i> Walker	白斑葉枯病	菌糸腐敗病	
	<i>Botrytis cinerea</i> Persoon		—	灰色かび病
	<i>Botrytis squamosa</i> Walker		小菌核腐敗病	小菌核性腐敗病
<i>Sclerotium allii</i> Sawada	小菌核病			
細菌	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	軟腐病		

アスパラガスの病害

27. 立枯病



27a. 黄化葉



27b. 罹病株 茎の褐変、葉の黄化

28. 株腐病



28a. 下位葉の褐変



28b. 地上部の枯死



28c. 地下茎上部、芽部の褐変