

5) 果樹類病虫害調査結果

(1) なし

		黒星病	黒斑病	赤星病	輪紋病	火傷病	アブラムシ類寄生枝率	ハダニ類	ハマキムシ類	備考	
5月	発生ほ場数(か所)	3	0	0	0	0	19	2	0	7、8、19日調査 総調査ほ場数: 28か所 総調査葉数: 11,200葉 (調査葉数 400葉) アブラムシ類は徒長枝200枝)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9	7.1		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	4.6	0.0	1.4	0.0	0.0	66.9	3.9		6.6
	発生株数(株)		14	0	0	0	0	586	1		0
	発生葉率	発生葉率(%)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0		0.0
		平年値(%)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.2		0.0
	概評		平年並	少	-	-	-	平年並	平年並		少
6月	発生ほ場数(か所)	15	0	0	0	0	20	0	0	8、9日調査 総調査ほ場数: 29か所 総調査葉数: 11,600葉 (調査葉数 400葉) アブラムシ類は徒長枝200枝)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	0.0		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	27.6	0.0	17.2	0.0	0.0	71.7	1.9		2.9
	発生株数(株)		139	0	0	0	0	841	0		0
	発生葉率	発生葉率(%)	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0		0.0
		平年値(%)	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	9.6	0.4		0.0
	概評		多	少	少	-	-	平年並	少		少
7月	発生ほ場数(か所)	16	0	4	0	0	13	0	0	6、7日調査 総調査ほ場数: 29か所 総調査葉数: 11,600葉 (調査葉数 400葉) アブラムシ類は徒長枝200枝)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	55.2	0.0	13.8	0.0	0.0	44.8	0.0		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	34.0	1.6	15.7	0.0	0.0	62.3	0.0		5.4
	発生株数(株)		131	0	10	0	0	105	0		0
	発生葉率	発生葉率(%)	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0		0.0
		平年値(%)	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	6.4	0.0		0.0
	概評		やや多	少	やや少	-	-	平年並	少		少
8月	発生ほ場数(か所)	17	0	0	0	0	6	0	0	10、11日調査 総調査ほ場数: 30か所 総調査葉数: 12,000葉 (調査葉数 400葉) アブラムシ類は徒長枝200枝)	
	発生ほ場率	発生ほ場率(%)	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0		0.0
		発生ほ場率平年値(%)	28.6	3.4	19.2	0.0	0.0	19.8	9.6		10.1
	発生株数(株)		67	0	0	0	0	21	0		0
	発生葉率	発生葉率(%)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		0.0
		平年値(%)	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.2		0.2
	概評		多	少	少	-	-	平年並	少		少

(参考) なし病虫害発生状況マップ

なし黒星病発生葉率(2009年5月)



程度	無	少	中	多・甚
発生株率(%)	0	0.1~5	5.1~15	15.1以上
記号	x			

なし黒星病発生葉率(2009年6月)



程度	無	少	中	多・甚
発生株率(%)	0	0.1~5	5.1~15	15.1以上
記号	x			