

6) 花き類病害虫調査結果

(1) きく

| | | 白さび病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | コナジラミ類 | 備考 | |
|-----|-----------|-------------|--------|------|--------|---------|--------|----------|--------------|
| 1月 | 発生ほ場数(か所) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13、16日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数: 10か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 7.7 | 6.4 | 14.6 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 総調査株数: 500株 |
| | 発生株数(株) | | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 平年値(%) | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 概評 | | 少 | - | 多 | 少 | - | - | | |
| 2月 | 発生ほ場数(か所) | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16、17日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 23.1 | 23.1 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数: 13か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 9.7 | 4.4 | 14.5 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 総調査株数: 650株 |
| | 発生株数(株) | | 19 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 2.9 | 0.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 平年値(%) | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 概評 | | 多 | 多 | 多 | 少 | - | - | | |
| 3月 | 発生ほ場数(か所) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9、10日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 25.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数: 12か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 1.5 | 0.7 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 総調査株数: 600株 |
| | 発生株数(株) | | 41 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 6.8 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 平年値(%) | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 概評 | | 多 | 多 | 多 | 少 | - | - | | |
| 4月 | 発生ほ場数(か所) | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13~15日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 7.7 | 7.7 | 61.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数: 13か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 3.7 | 6.3 | 17.0 | 1.2 | 7.9 | 0.0 | 総調査株数: 650株 |
| | 発生株数(株) | | 5 | 4 | 167 | 4 | 0 | 0 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 0.8 | 0.6 | 25.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 平年値(%) | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 概評 | | やや多 | 平年並 | 多 | 平年並 | - | - | | |
| 5月 | 発生ほ場数(か所) | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7、8日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 10.0 | 20.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数: 10か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 15.7 | 3.9 | 9.1 | 10.3 | 26.3 | 0.0 | 総調査株数: 500株 |
| | 発生株数(株) | | 1 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 0.2 | 2.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 平年値(%) | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 概評 | | やや少 | やや多 | 多 | やや少 | - | - | | |
| 6月 | 発生ほ場数(か所) | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8、9日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 20.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 総調査ほ場数: 10か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 12.0 | 10.9 | 13.0 | 18.8 | 35.2 | 19.7 | 総調査株数: 500株 |
| | 発生株数(株) | | 50 | 2 | 168 | 2 | 5 | 0 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 10.0 | 0.4 | 33.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | |
| | | 平年値(%) | 3.1 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 4.6 | 1.0 | |
| 概評 | | やや多 | 平年並 | 多 | やや少 | - | - | | |
| 7月 | 発生ほ場数(か所) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6、7日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 総調査ほ場数: 10か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 13.1 | 7.5 | 27.6 | 15.9 | 22.3 | 25.5 | 総調査株数: 500株 |
| | 発生株数(株) | | 9 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 1.8 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| | | 平年値(%) | 4.8 | 0.8 | 9.5 | 2.4 | 5.1 | 1.5 | |
| 概評 | | やや多 | 少 | やや多 | 少 | - | - | | |
| 8月 | 発生ほ場数(か所) | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10、11日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 総調査ほ場数: 10か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 5.4 | 8.5 | 24.6 | 8.8 | 14.2 | 18.0 | 総調査株数: 500株 |
| | 発生株数(株) | | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 7 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | |
| | | 平年値(%) | 2.1 | 0.9 | 9.3 | 1.1 | 2.4 | 1.0 | |
| 概評 | | 少 | 少 | 多 | やや少 | - | - | | |
| 9月 | 発生ほ場数(か所) | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 総調査ほ場数: 12か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 3.3 | 3.8 | 14.6 | 8.4 | 8.5 | 19.6 | 総調査株数: 600株 |
| | 発生株数(株) | | 0 | 0 | 185 | 9 | 0 | 13 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | |
| | | 平年値(%) | 1.3 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | |
| 概評 | | 少 | 少 | 多 | やや多 | - | - | | |
| 10月 | 発生ほ場数(か所) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13~15日調査 | |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率(%) | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 総調査ほ場数: 12か所 |
| | | 発生ほ場率平年値(%) | 5.8 | 0.9 | 22.9 | 12.9 | 15.4 | 11.1 | 総調査株数: 600株 |
| | 発生株数(株) | | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 6 | (調査株数 50株) |
| | 発生株率 | 発生株率(%) | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| | | 平年値(%) | 0.2 | 0.1 | 6.6 | 0.7 | 4.5 | 0.4 | |
| 概評 | | 少 | 少 | 多 | 少 | - | - | | |

| | | 白さび病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | コナジラミ類 | 備考 | |
|-----|-----------|--------------|--------|------|--------|---------|--------|------|---|
| 11月 | 発生ほ場数(か所) | | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9, 12日調査 総調査ほ場数: 12か所 総調査株数: 600株 (調査株数 50株) |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率 (%) | 33.3 | 8.3 | 75.0 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | |
| | | 発生ほ場率平年値 (%) | 12.6 | 1.7 | 14.5 | 3.7 | 8.3 | 4.2 | |
| | 発生株数(株) | | 14 | 2 | 81 | 3 | 0 | 17 | |
| | 発生株率 | 発生株率 (%) | 2.3 | 0.3 | 13.5 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | |
| | | 平年値 (%) | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | |
| | 概評 | | やや多 | 平年並 | 多 | やや多 | - | - | |
| 12月 | 発生ほ場数(か所) | | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7, 8日調査 総調査ほ場数: 12か所 総調査株数: 600株 (調査株数 50株) |
| | 発生ほ場率 | 発生ほ場率 (%) | 16.7 | 0.0 | 58.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 発生ほ場率平年値 (%) | 5.7 | 1.9 | 25.7 | 0.0 | 3.1 | 4.2 | |
| | 発生株数(株) | | 26 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | |
| | 発生株率 | 発生株率 (%) | 4.3 | 0.0 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 平年値 (%) | 0.8 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| | 概評 | | 多 | 少 | 多 | やや多 | - | - | |