

水稻(育苗箱)

単位: %

		苗立枯病	ムシ苗	細菌性病害	ばか苗病	備考
発生箱率 (%)	本年平均値	0.00	0.00	0.00	0.00	令和2(2020)年4月13, 14日調査 総育苗施設数: 13 調査育苗箱数: 122,263
	平年値	0.00	0.00	0.00	0.03	
平年比		0.0	0.0	0.0	7.5	
発生程度		少	少	少	少	
概評		少	少	少	少	※平年比 = (平均値 / 平年値) × 100

麦類(4月中旬)

単位: %

		うどんこ病	赤かび病	大麦斑葉病	黒節病	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	3	16	平成2(2020)年4月3~8日調査 総調査ほ場数: 40 総調査茎数: 2000 (調査茎数 50茎)
	本年平均値	0.0	0.0	9.4	50.0	
	平年値	1.8	0.0	12.3	26.4	
	平年比	0.0	0.0	76.2	189.3	
発生茎率	発生程度	少	少	平年並	多	※黒節病の平年値は平成24~31年の8カ年平均 ※平年比 = (本年平均値 / 平年値) × 100 ※大麦斑葉病は大麦のみ調査 ※調査茎数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生茎数	0	0	1	5	
	本年平均値	0.0	0.0	0.1	0.3	
	平年値	0.7	0.0	0.1	0.5	
平年比		0.0	0.0	101.0	53.8	
発生程度		少	少	平年並	やや少	
概評		少	少	平年並	やや多	

麦類(小麦縞萎縮病)

単位: %

		小麦縞萎縮病	備考
発生ほ場率	4.3	調査ほ場数: 305 調査月日: 令和2(2020)年4月3~8日 ※平年値は平成24(2012)~31(2019)年の8カ年平均 ※平年比 = (本年平均値 / 平年値) × 100 ※車上調査	
平年値	6.0		
平年比	71.3		
発生程度	平年並		
概評	平年並		

いちご

単位: %

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	アザミウマ類(花)	備考
ほ場率	発生ほ場数	10	1	1	6	11	27	10	0	0	25	総調査ほ場数: 65か所 総調査株数: 1,625株 (調査株数 25株(調査花数 50花)) ※平年比 = (本年平均値 / 平年値) × 100
	本年平均値	15.4	1.5	1.5	9.2	16.9	41.5	15.4	0.0	0.0	39.7	
	平年値	3.5	11.2	5.3	7.0	13.7	56.4	27.6	0.0	-	54.5	
	平年比	440.0	13.4	28.3	131.4	123.4	73.6	55.8	-	-	72.8	
発生株率	発生程度	多	少	やや少	平年並	平年並	平年並	やや少	少	少	平年並	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント 連は連棟、単は単棟ハウス 備考に品種名の記入がない場合は「とちおとめ」で調査
	発生株数	2	1	1	2	17	137	52	0	0	107	
	本年平均値	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	8.4	3.2	0.0	0.0	3.4	
	平年値	0.0	0.8	0.3	0.1	1.7	18.2	5.6	0.0	-	5.4	
平年比		-	12.5	33.3	100.0	58.8	46.2	57.1	-	-	63.0	
発生程度		-	少	やや少	平年並	やや少	やや少	やや少	少	少	平年並	
概評		(多)	少	やや少	平年並	平年並	平年並	やや少	少	少	平年並	

トマト

単位: %

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉率)	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫および被害	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	17	0	3	0	3	6	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数: 23か所 総調査株数: 1,150株 (調査数: 50株、100果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉) 冬春トマト
	本年平均値	73.9	0.0	13.0	0.0	13.0	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	54.2	0.0	11.8	1.7	12.9	10.0	0.5	2.8	22.7	1.3	0.0	0.0	
	平年比	136.3	-	110.2	0.0	100.8	261.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
株率	発生程度	平年並	少	平年並	少	平年並	多	少	少	少	少	少	少	※コナジラミ類は26年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考値。 ※タバコガ類幼虫および被害はH28.6~。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。 ※すすかび病の平年値は過去8年の値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	58	0	14	0	43	19	0	0	0	0	0	0	
	本年平均値	5.0	0.0	1.2	0.0	3.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	6.6	0.0	2.9	0.1	3.0	0.5	0.0	0.2	1.4	0.1	0.0	0.0	
平年比		75.8	-	41.4	0.0	123.3	340.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	
発生程度		平年並	少	やや少	少	平年並	多	少	少	少	少	少	少	
概評		平年並	少	平年並	少	(平年並)	多	少	少	少	少	少	少	

きゅうり

単位：%

		灰色かび病 (株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病 (株率)	モザイク病 (株率)	黄化えそ病 (株率)	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類 幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫 (株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	5	4	1	0	0	3	1	2	0	2	0	0	総調査ほ場数：9か所 総調査葉数：900葉 総調査株数：225株 (調査葉数 100葉) (調査株数 25株)
	本年平均値	0.0	55.6	44.4	11.1	0.0	0.0	33.3	11.1	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	
	平年値	0.9	23.2	48.2	21.0	0.0	0.0	16.0	8.0	31.0	2.0	10.8	4.6	0.0	
	平年比	0.0	239.7	92.1	52.9	-	-	208.1	138.8	71.6	0.0	205.6	0.0	-	
	発生程度	少	多	平年並	やや少	少	少	多	平年並	平年並	少	多	少	少	
葉率・株率	発生葉・株数	0	65	37	2	0	0	25	2	101	0	1	0	0	※平年比=(本年平均値/平年値)×100 ※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病は29年度から株率調査。それ以前は、葉率調査のため平年値は参考値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	7.2	4.1	0.2	0.0	0.0	11.1	0.2	11.2	0.0	0.1	0.0	0.0	
	平年値	0.0	3.1	8.7	2.1	0.0	0.0	1.3	0.6	5.5	0.0	0.7	0.1	0.0	
	平年比	-	232.3	47.1	9.5	-	-	853.8	35.1	203.6	-	14.3	0.0	-	
	発生程度	少	多	やや少	少	少	少	多	やや少	多	少	少	少	少	
概 評		少	多	平年並	やや少	少	(少)	多	平年並	やや多	少	平年並	(少)	少	

たまねぎ

単位：%

		さび病	べと病	白色疫病	黒斑病	灰色かび病	黒点葉枯病	ポトリチス葉枯病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	0	0	0	3	0	0	2	0	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株) ※平年比=(本年平均値/平年値)×100 ※白色疫病はH28.4から調査開始。
	本年平均値	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	25.0	0.0	
	平年値	0.0	16.2	-	0.0	0.0	36.7	0.0	26.6	53.5	0.0	
	平年比	-	154.3	-	-	-	102.2	-	0.0	46.7	-	
	発生程度	少	多	少	少	少	平年並	少	少	やや少	少	
株率	発生株数	0	2	0	0	0	11	0	0	6	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※たまねぎの3月巡回調査は平年値をH22~25年のデータで算出。
	本年平均値	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	1.5	0.0	
	平年値	0.0	1.5	-	0.0	0.0	11.5	0.0	1.0	5.4	0.0	
	平年比	-	33.3	-	-	-	24.3	-	0.0	27.8	-	
	発生程度	少	やや少	少	少	少	やや少	少	少	やや少	少	
概 評		少	やや多	少	少	(少)	(平年並)	(少)	(少)	やや少	(少)	

きく

単位：%

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	5	2	0	0	0	総調査ほ場数：10か所 総調査株数：500株 (調査株数 50株) ※平年比=(平均値/平年値)×100
	本年平均値	20.0	0.0	50.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	13.1	10.3	47.6	11.5	0.0	1.9	0.0	
	平年比	152.7	0.0	105.0	173.9	-	0.0	-	
	発生程度	やや多	少	平年並	やや多	少	少	少	
株率	発生株数	24	0	53	10	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	4.8	0.0	10.6	2.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	2.8	0.6	12.2	1.0	0.0	0.1	0.0	
	平年比	171.4	0.0	86.9	200.0	-	0.0	-	
	発生程度	やや多	少	平年並	多	少	少	少	
概 評		やや多	少	平年並	やや多	(少)	(少)	(少)	