

麦類(5月上旬)

		うどんこ病	赤かび病	大麦斑葉病	黒節病	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	7	9	令和3(2021)年4月28、30日調査
	平均値	0.0	0.0	21.9	22.5	調査ほ場数: 40
	平年値	4.5	0.0	15.2	14.9	調査茎数: 2000
	平年比	0.0	0.0	144.3	151.5	(調査茎数 50茎)
	発生程度	少	少	やや多	やや多	
発生茎率	発生茎数	0	0	16	12	
	平均値	0.0	0.0	1.0	0.6	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
	平年値	2.2	0.0	0.4	0.2	※大麦斑葉病は大麦のみ調査
	平年比	0.0	0.0	265.4	292.7	※調査茎数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	少	少	多	多	
概 評		少	少	やや多	やや多	

麦類(5月上旬・赤かび病)

		赤かび病	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	令和3(2021)年5月10~12日調査
	平均値	0.0	調査ほ場数: 42
	平年値	8.7	調査穂数: 4200
	平年比	0.0	(調査穂数 1地点100穂)
	発生程度	少	
発生穂率	発生穂数	0	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
	平均値	0.0	※調査穂数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	0.0	
	平年比	0.0	
	発生程度	少	
概 評		少	

トマト

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉病	モザイク病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉草)	アザミウマ類(花草)	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫および被害	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	1	7	0	8	1	0	1	3	0	0	0	0	総調査ほ場数: 20か所
	本年平均値	20.0	5.0	35.0	0.0	40.0	5.0	0.0	5.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数: 1,000株
	平年値	51.4	0.4	14.8	2.9	25.3	10.8	0.0	4.3	23.5	0.0	2.8	0.0	0.0	(調査数: 50株、100果、葉かび・すすかび150果、その他100果)
	平年比	38.9	1250.0	236.5	0.0	158.1	46.3	-	116.3	63.8	-	0.0	-	-	冬春トマト
	発生程度	やや少	多	多	少	やや多	やや少	少	平年並	平年並	少	少	少	少	
株率	発生株数	30	0	90	0	103	4	0	1	12	0	0	0	0	※コナジラミ類は2014年以降は葉草。以前は株率のため、平年値は参考値。
	本年平均値	3.0	0.0	9.0	0.0	10.3	0.4	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	※アザミウマ類(花草)は~2015、2021~。平年値は参考値。
	平年値	7.0	0.0	4.8	0.4	5.9	0.8	0.0	0.0	1.6	0.0	0.2	0.0	0.0	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6~。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	平年比	42.9	-	187.5	0.0	174.6	50.0	-	333.3	37.5	-	0.0	-	-	※すすかび病の平年値は過去9年の値。
	発生程度	やや少	少	多	少	やや多	やや少	少	多	やや少	少	少	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評		やや少	少	多	少	(やや多)	やや少	少	やや多	平年並	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	モザイク病(株率)	黄化えそ病(株率)	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	総調査ほ場数: 6か所
	本年平均値	16.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	総調査葉数: 600葉
	平年値	2.0	46.0	50.9	14.2	0.0	1.3	12.8	6.0	24.8	2.5	16.5	9.5	0.0	総調査株数: 150株
	平年比	835.0	145.0	131.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	-	(調査葉数 100葉)
	発生程度	多	やや多	平年並	少	少	少	少	少	少	少	多	少	少	(調査株数 25株)
葉率・株率	発生葉・株数	2	42	36	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
	本年平均値	1.3	7.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	※灰色かび病は2014年度から、ハスモンヨトウ幼虫は2016年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病は2017年度から株率調査。それ以前は、葉率調査のため平年値は参考値。
	平年値	0.0	9.4	9.1	2.3	0.0	0.0	1.5	0.3	4.0	0.1	0.9	0.1	0.0	
	平年比	-	74.5	65.9	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	-	
	発生程度	-	平年並	平年並	少	少	少	少	少	少	少	多	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評		やや多	やや多	平年並	少	少	少	少	少	少	多	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

たまねぎ

		さび病	べと病	白色疫病	黒斑病	灰色かび病	黒点葉枯病	ポトリチス葉枯病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	3	0	1	0	2	0	0	8	0	総調査ほ場数: 8か所
	本年平均値	0.0	37.5	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	0.0	100.0	0.0	総調査株数: 400株
	平年値	0.0	55.6	-	16.3	0.0	11.3	0.0	13.0	95.8	1.4	(調査株数 50株)
	平年比	-	67.4	-	76.7	-	221.2	-	0.0	104.4	0.0	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
	発生程度	少	平年並	少	多	少	多	少	少	平年並	少	※白色疫病はH28.4から調査開始。
株率	発生株数	0	8	0	2	0	4	0	0	223	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	2.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	55.8	0.0	※たまねぎの3月巡回調査は平年値を2011~2013、2020年のデータで算出。
	平年値	0.0	9.1	-	3.8	0.0	2.0	0.0	1.3	69.9	0.0	
	平年比	-	22.0	-	13.2	-	50.0	-	0.0	79.8	-	
	発生程度	少	やや少	少	多	少	やや少	少	少	平年並	少	
概 評		少	平年並	少	多	少	やや少	少	少	平年並	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

単位：％

		黒星病	黒斑病	赤星病	ハダニ類	ハマキムシ類被害枝率	サビダニ類被害枝率	アブラムシ類寄生枝率	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	1	0	0	0	1	総調査ほ場数：19か所 総調査葉数：7,600葉 (調査葉数 400葉) 総調査枝・果実数：1,900枝・果実 (調査枝・果実数 100枝・果実) ※ $年比 = (平均値 / 前年値) \times 100$ ※サビダニ類被害枝率は2016年度から調査開始 ※ハマキムシ類被害枝率は2015年度から調査開始以前は葉での幼虫調査 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	
	前年値	5.4	0.0	3.0	0.0	0.0	15	60.7	
	年比	0.0	-	176.7	-	-	0.0	8.7	
葉率・枝率	発生程度	少	少	やや多	少	少	少	少	
	発生葉数	0	0	1	0	0	0	1	
	本年平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
	前年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	6.9	
概 評	年比	-	-	-	-	-	-	1.4	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と前年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	3	2	0	0	0	総調査ほ場数：9か所 総調査株数：450株 (調査株数 50株) ※ $年比 = (平均値 / 前年値) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	11.1	0.0	33.3	22.2	0.0	0.0	0.0	
	前年値	16.3	19.7	60.6	22.1	1.0	1.0	0.0	
	年比	68.1	0.0	55.0	100.5	0.0	0.0	-	
株率	発生程度	平年並	少	やや少	平年並	少	少	少	
	発生株数	7	0	17	20	0	0	0	
	本年平均値	1.6	0.0	3.8	4.4	0.0	0.0	0.0	
	前年値	2.5	2.2	16.3	3.0	0.0	0.0	0.0	
概 評	年比	64.0	0.0	23.3	146.7	-	-	-	
	発生程度	平年並	少	やや少	やや多	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と前年値の比較)が-となっているものの概評を示す