

ウンカ類・ヨコバイ類越冬前密度

単位：%、10mあたりの頭数

		ウンカ類 幼虫	ヒメトビ ウンカ成 虫	その他ウ ンカ類成 虫	ヨコバイ 類幼虫	ツマグロ ヨコバイ 成虫	イナズマ ヨコバイ 成虫	その他の ヨコバイ 類成虫	備考
発生ほ場数		17	3	4	17	8	1	18	総調査ほ場数：19ほ場
ほ場率	本年平均値	89.5	15.8	21.1	89.5	42.1	5.3	94.7	調査方法：背負型動力機を使用した吹き出し法で0.3m×11mを吹き出しすくい取り調査した。 ※頭数合計は10mあたりの頭数に換算値(×3)。 ※密度=頭数/10m ² ※年比=(本年平均値/年値)×100
	年値	89.2	9.2	1.9	63.8	28.3	2.3	63.2	
	年比	100.3	171.6	1108.0	140.2	148.8	228.8	149.9	
	発生程度	平年並	やや多	多	やや多	やや多	多	やや多	
頭数合計		1869	15	15	2517	153	12	3627	
密度	本年平均値	98.4	0.8	0.8	132.5	8.1	0.6	190.9	※年比=(本年平均値/年値)×100
	年値	62.9	0.4	0.1	52.1	2.4	0.1	22.3	
	年比	156.4	197.4	789.5	254.3	335.5	631.6	856.0	
	発生程度	やや多	多	多	多	多	多	多	
概 評		やや多	やや多	多	やや多	やや多	多	やや多	

いちご

単位：%

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモン ヨトウ幼 虫	シロイチモ ジヨトウ幼 虫	アザミ ウマ類 (花)	備考
発生ほ場数		6	1	7	1	4	19	18	2	0	2	総調査ほ場数：66か所 総調査株数：1,650株 (調査株数 25株)
ほ場率	本年平均値	9.1	1.5	10.6	1.5	6.1	28.8	27.3	3.0	0.0	3.0	※年比=(本年平均値/年値)×100
	年値	8.9	0.6	12.0	8.6	8.6	42.7	24.4	2.8	-	10.1	
	年比	102.2	250.0	88.3	17.4	70.9	67.4	111.9	107.1	-	29.7	
	発生程度	平年並	多	平年並	少	平年並	平年並	平年並	平年並	少	やや少	
発生株数		4	1	23	0	9	119	59	1	0	2	
発生株率	本年平均値	0.2	0.1	1.4	0.0	0.5	7.2	3.6	0.1	0.0	0.1	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	年値	0.1	0.0	1.1	0.1	1.0	12.8	3.0	0.1	-	0.3	
	年比	200.0	-	127.3	0.0	50.0	56.3	120.0	100.0	-	33.3	
	発生程度	多	-	平年並	少	やや少	やや少	平年並	平年並	少	やや少	
概 評		やや多	やや多	平年並	少	平年並	平年並	平年並	平年並	少	やや少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位：%

		灰色か び病	疫病	葉か び病	すす かび病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	モザ イク 病	アブ ラム シ類	コナジ ラミ類 (葉 率)	アザミ ウマ類 (花 率)	ハモグ リバエ 類幼虫	タバコ ガ類幼 虫および 被害	ハスモ ンヨト ウ幼虫	備考
発生ほ場数		0	0	5	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	総調査ほ場数：22か所
ほ場率	本年平均値	0.0	0.0	22.7	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：1,100株 (調査数：50株、100果、葉かび・すすかび150果、その他100果)
	年値	10.0	1.9	9.7	10.5	5.9	15.0	0.5	0.9	19.6	0.0	1.8	0.0	1.4	冬春トマト
	年比	0.0	0.0	234.0	42.9	76.3	0.0	0.0	0.0	139.3	-	0.0	-	0.0	
	発生程度	少	少	多	やや少	平年並	少	少	少	平年並	少	少	少	少	
発生株数		0	0	55	2	12	0	0	0	17	0	0	0	0	※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、年値は参考値。
株率	本年平均値	0.0	0.0	5.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、年値は参考値。
	年値	0.2	0.1	2.8	0.9	0.8	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	
	年比	0.0	0.0	178.6	22.2	137.5	0.0	-	0.0	160.0	-	0.0	-	-	
	発生程度	少	少	やや多	やや少	平年並	少	少	少	やや多	少	少	少	少	
概 評		少	少	多	やや少	平年並	少	少	少	平年並	少	少	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位：％

		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	モザイク病(株率)	黄化えそ病(株率)	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	総調査ほ場数：8か所
	本年平均値	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	総調査葉数：800葉
	平年値	2.0	23.2	26.5	14.1	0.0	5.0	10.2	5.3	10.5	2.5	22.7	3.3	2.0	総調査株数：200株
	平年比	0.0	53.9	94.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.1	0.0	0.0	(調査葉数 100葉)
葉率・株率	発生程度	少	やや少	平年並	少	少	少	少	少	少	少	平年並	少	少	(調査株数 25株)
	発生葉・株数	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
	本年平均値	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	※灰色かび病は2014年度から、ハスモンヨトウ幼虫は2016年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病は2017年度から株率調査。それ以前は、葉率調査のため平年値は参考値。
	平年値	0.0	2.7	1.3	3.9	0.0	0.2	0.4	0.1	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	-	22.2	7.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	50.0	-	-	
発生程度	少	やや少	少	少	少	少	少	少	少	少	やや少	少	少		
概 評		少	やや少	やや少	少	少	少	少	少	少	少	平年並(少)	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

にら

単位：％

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	0	0	0	1	総調査ほ場数：18か所
	本年平均値	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	総調査株数：900株
	平年値	12.3	5.6	0.6	0.0	18.4	8.5	(調査株数 50株)
	平年比	90.2	0.0	0.0	-	0.0	65.9	※平年比=(平均値/平年値)×100
株率	発生程度	平年並	少	少	少	少	平年並	※株率の平年値は過去10年の値
	発生株数	2	0	0	0	0	1	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
	平年値	4.8	0.1	0.0	0.0	0.9	1.4	
	平年比	4.2	0.0	-	-	0.0	7.1	
発生程度	少	少	少	少	少	少		
概 評		やや少	少	少	(少)	少	やや少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	7	0	0	0	0	総調査ほ場数：10か所
	本年平均値	20.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：500株
	平年値	9.6	6.3	53.5	6.2	0.0	6.3	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	208.3	0.0	130.8	0.0	-	0.0	-	※平年比=(平均値/平年値)×100
株率	発生程度	多	少	平年並	少	少	少	少	
	発生株数	11	0	45	0	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	2.2	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.2	0.3	11.6	0.7	0.0	0.1	0.0	
	平年比	183.3	0.0	77.6	0.0	-	0.0	-	
発生程度	多	少	平年並	少	少	少	少		
概 評		多	少	平年並	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す