

病害虫発生現況情報(平成22年2月)

栃木県農業環境指導センター

いちご

単位:%

|           |             | 炭疽病 | 灰色かび病 | うどんこ病 | 萎黄病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | コナジラミ類 | アザミウマ類 | ハスモンヨトウ幼虫 | 備考   |
|-----------|-------------|-----|-------|-------|-----|--------|------|--------|--------|-----------|--|
| 発生ほ場数(か所) |             | 2   | 2     | 6     | 6   | 2      | 34   | 36     | 1      | 0         | 5、8日調査<br>総調査ほ場数:70か所<br>総調査株数:1,750株<br>(調査株数:1ほ場25株) |
| 発生ほ場率     | 発生ほ場率(%)    | 2.9 | 2.9   | 8.6   | 8.6 | 2.9    | 48.6 | 51.4   | 1.4    | 0.0       |  |
|           | 発生ほ場率平年値(%) | 3.8 | 7.0   | 7.1   | 1.0 | 3.8    | 28.8 | 50.9   | 0.0    | 0.0       |  |
| 発生株数(株)   |             | 0   | 2     | 3     | 0   | 10     | 330  | 233    | 8      | 0         |  |
| 発生株率      | 発生株率(%)     | 0.0 | 0.1   | 0.2   | 0.0 | 0.6    | 18.9 | 13.3   | 0.5    | 0.0       |  |
|           | 平年値(%)      | 0.2 | 0.4   | 0.8   | 0.0 | 0.6    | 9.1  | 12.9   | 0.0    | 0.0       |  |
| 概評        |             | やや少 | 平年並   | 平年並   | やや多 | 平年並    | 多    | 平年並    | やや少    | 少         |  |

トマト

単位:%

|           |             | 灰色かび病 | 疫病  | 葉かび病 | うどんこ病 | 黄化葉巻病 | モザイク病 | アブラムシ類 | コナジラミ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類幼虫 | オオタバコガ幼虫 | ハスモンヨトウ幼虫 | 備考   |
|-----------|-------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|--|
| 発生ほ場数(か所) |             | 11    | 0   | 1    | 3     | 0     | 0     | 0      | 5      | 0      | 0         | 0        | 0         | 5、8、9日調査<br>総調査ほ場数:25か所<br>総調査株数:1,250株<br>(調査株数:1ほ場50株) |
| 発生ほ場率     | 発生ほ場率(%)    | 44.0  | 0.0 | 4.0  | 12.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 20.0   | 0.0    | 0.0       | 0.0      | 0.0       |  |
|           | 発生ほ場率平年値(%) | 15.5  | 0.0 | 7.6  | 5.1   | 2.1   | 0.4   | 0.4    | 22.3   | 0.0    | 1.4       | 0.0      | 0.0       |  |
| 発生株数(株)   |             | 146   | 0   | 4    | 35    | 0     | 0     | 0      | 95     | 0      | 0         | 0        | 0         |  |
| 発生株率      | 発生株率(%)     | 11.7  | 0.0 | 0.3  | 2.8   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 7.6    | 0.0    | 0.0       | 0.0      | 0.0       |  |
|           | 平年値(%)      | 0.9   | 0.0 | 1.0  | 0.2   | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 3.1    | 0.0    | 0.4       | 0.0      | 0.0       |  |
| 概評        |             | 多     | 少   | やや少  | やや多   | 少     | 少     | 少      | やや多    | 少      | 少         | 少        | 少         |  |

きゅうり

|           |             | 灰色かび病 | べと病  | うどんこ病 | 褐斑病  | 疫病  | モザイク病 | アブラムシ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類幼虫 | コナジラミ類 | ハダニ類 | ハスモンヨトウ幼虫 | 備考   |
|-----------|-------------|-------|------|-------|------|-----|-------|--------|--------|-----------|--------|------|-----------|--|
| 発生ほ場数(か所) |             | 0     | 1    | 3     | 2    | 0   | 0     | 0      | 3      | 1         | 0      | 1    | 0         | 5、8日調査<br>総調査ほ場数:10か所<br>総調査葉数:1,000葉<br>(調査葉数:100葉) |
| 発生ほ場率     | 発生ほ場率(%)    | 0.0   | 10.0 | 30.0  | 20.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0    | 30.0   | 10.0      | 0.0    | 10.0 | 0.0       |  |
|           | 発生ほ場率平年値(%) | 2.0   | 29.0 | 23.9  | 15.5 | 0.0 | 0.0   | 0.0    | 4.7    | 0.0       | 12.5   | 0.0  | 0.0       |  |
| 発生葉数(葉)   |             | 0     | 0    | 26    | 3    | 0   | 0     | 0      | 56     | 2         | 0      | 1    | 0         |  |
| 発生葉率      | 発生葉率(%)     | 0.0   | 0.0  | 2.6   | 0.3  | 0.0 | 0.0   | 0.0    | 5.6    | 0.2       | 0.0    | 0.1  | 0.0       |  |
|           | 平年値(%)      | 0.1   | 0.6  | 1.9   | 3.1  | 0.0 | 0.0   | 0.0    | 0.4    | 0.0       | 0.3    | 0.0  | 0.0       |  |
| 概評        |             | 少     | やや少  | 平年並   | やや少  | 少   | -     | 少      | やや多    | やや少       | 少      | -    | 少         |  |

にら

|           |             | 白斑葉枯病 | 乾腐病 | さび病 | 株腐細菌病 | ネダニ | アザミウマ類 | 備考  |
|-----------|-------------|-------|-----|-----|-------|-----|--------|---|
| 発生ほ場数(か所) |             | 0     | 0   | 0   | 0     | 1   | 2      | 5、8日調査<br>総調査ほ場数:20か所<br>(遠観調査を行い発生程度を判定) |
| 発生ほ場率     | 発生ほ場率(%)    | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 5.0 | 10.0   |   |
|           | 発生ほ場率平年値(%) | 14.4  | 2.3 | 0.0 | 0.8   | 1.8 | 3.9    |   |
| 概評        |             | やや少   | 少   | 少   | 少     | やや少 | -      |   |

きく

単位:%

|           |             | 白さび病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | コナジラミ類 | 備考  |
|-----------|-------------|------|--------|------|--------|---------|--------|---|
| 発生ほ場数(か所) |             | 1    | 0      | 1    | 1      | 0       | 0      | 5、8日調査<br>総調査ほ場数:10か所<br>総調査株数:500株<br>(調査株数:50株) |
| 発生ほ場率     | 発生ほ場率(%)    | 10.0 | 0.0    | 10.0 | 10.0   | 0.0     | 0.0    |   |
|           | 発生ほ場率平年値(%) | 11.1 | 6.3    | 19.2 | 1.7    | 2.5     | 0.0    |   |
| 発生株数(株)   |             | 29   | 0      | 1    | 1      | 0       | 0      |   |
| 発生株率      | 発生株率(%)     | 5.8  | 0.0    | 0.2  | 0.2    | 0.0     | 0.0    |   |
|           | 平年値(%)      | 1.6  | 0.3    | 3.9  | 0.0    | 0.0     | 0.0    |   |
| 概評        |             | やや多  | 少      | やや少  | やや少    | -       | -      |   |