病害虫発生現況情報（平成２３年１２月）

栃木県農業環境指導センター

いちご

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	アザミウマ類	アザミウマ類（花）	備考
ほ場率	発生ほ場数	5	2	13	9	8	39	8	4	5	6	総調査ほ場数：69か所　(ｱｻﾞﾐｳﾏ類(花)調査ほ場数：26か所)
	平均値	7.2	2.9	18.8	13.0	11.6	56.5	11.6	5.8	7.2	23.1	総調査株数：1,725株　(ｱｻﾞﾐｳﾏ類(花)総調査花数：2,600花)
	平年値	3.8	1.7	19.7	3.7	7.7	24.4	42.6	3.9	0.5	19.2	(調査株数：1ほ場25株(ｱｻﾞﾐｳﾏ類(花)調査花数：1ほ場100花))
	(平均値／平年値)×100	189.5	170.6	95.4	351.4	150.6	231.6	27.2	148.7	1440.0	120.3	※アザミウマ類(花)の平年値は過去１年分のみの値
	発生程度	多	やや多	平年並	多	やや多	多	やや少	やや多	多	前年並	
株率	発生株数	0	4	40	6	50	293	11	2	4	14	
	平均値	0.0	0.2	2.3	0.3	2.9	17.0	0.6	0.1	0.2	0.5	
	平年値	0.1	0.1	2.1	0.1	1.2	7.3	7.1	0.2	0.0	0.7	
	(平均値／平年値)×100	0.0	200.0	109.5	300.0	241.7	232.9	8.5	50.0	-	71.4	
	発生程度	少	多	平年並	多	多	多	少	やや少	-	前年並	
概　評		やや多	やや多	平年並	多	やや多	多	やや少	平年並	やや多		

トマト

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	オオタバコガ幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	3	0	0	2	1	4	0	1	8	0	1	0	0	総調査ほ場数：23か所
	平均値	13.0	0.0	0.0	8.7	4.3	17.4	0.0	4.3	34.8	0.0	4.3	0.0	0.0	総調査株数：1,150株
	平年値	5.0	1.3	2.6	0.0	10.4	4.1	0.0	0.4	35.7	0.0	8.2	1.1	2.2	(調査株数　50株)
	(平均値／平年値)×100	260.0	0.0	0.0	-	41.3	424.4	-	1075.0	97.5	-	52.4	0.0	0.0	
	発生程度	多	少	少	-	やや少	多	少	多	平年並	少	やや少	少	少	
株率	発生株数	10	0	0	5	29	1	0	1	13	0	1	0	0	
	平均値	0.9	0.0	0.0	0.4	2.5	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
	平年値	0.2	0.0	0.1	0.0	2.4	0.1	0.0	0.0	4.5	0.0	1.5	0.0	0.1	
	(平均値／平年値)×100	450.0	-	0.0	-	104.2	100.0	-	-	24.4	-	6.7	-	0.0	
	発生程度	多	少	少	-	平年並	平年並	少	-	やや少	少	少	少	少	
概　評		多	少	少	-	-	やや多	少	平年並	平年並	-	やや少	少	少	

きゅうり

		灰色かび病	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病	モザイク病	黄化えそ病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	総調査ほ場数：7か所
	平均値	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	42.9	0.0	0.0	総調査葉数：700葉
	平年値	6.0	23.4	49.3	28.2	0.0	0.0	0.0	1.4	18.9	16.7	22.4	4.2	0.0	(調査葉数　100葉)
	(平均値／平年値)×100	0.0	61.1	29.0	50.7	-	-	-	0.0	227.0	0.0	191.5	0.0	-	
	発生程度	少	平年並	やや少	やや少	少	少	少	少	多	少	多	少	少	
葉率	発生葉数	0	8	3	31	0	0	0	0	10	0	3	0	0	
	平均値	0.0	1.1	0.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.4	0.0	0.0	
	平年値	0.3	3.0	8.4	6.6	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	0.9	2.4	0.0	0.0	
	(平均値／平年値)×100	0.0	36.7	4.8	66.7	-	-	-	0.0	100.0	0.0	16.7	-	-	
	発生程度	少	やや少	少	平年並	少	少	少	少	平年並	少	少	少	少	
概　評		少	平年並	やや少	やや少	少	-	-	少	やや多	少	-	-	少	

にら

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	0	0	0	5	4	総調査ほ場数：14か所
	平均値	28.6	0.0	0.0	0.0	35.7	28.6	総調査株数：700株
	平年値	15.0	2.9	0.0	0.8	4.8	6.9	(調査株数　50株)
	(平均値／平年値)×100	190.7	0.0	-	0.0	743.8	414.5	※ただし、ネダニ類については100株、
	発生程度	多	少	少	少	多	多	アザミウマ類については25株調査とした
株率	発生株数	105	0	0	0	80	27	
	平均値	15.0	0.0	0.0	0.0	11.4	3.9	
	平年値	-	-	-	-	-	-	
	(平均値／平年値)×100	-	-	-	-	-	-	
	発生程度	-	-	-	-	-	-	
概　評		多	少	少	少	多	-	

きく

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	2	7	1	0	1	総調査ほ場数：9か所
	平均値	11.1	22.2	77.8	11.1	0.0	11.1	総調査株数：450株
	平年値	6.9	2.7	30.4	2.9	2.8	2.8	(調査株数　50株)
	(平均値／平年値)×100	160.9	822.2	255.9	382.8	0.0	396.4	
	発生程度	やや多	多	多	多	少	多	
株率	発生株数	3	1	104	6	0	1	
	平均値	0.7	0.2	23.1	1.3	0.0	0.2	
	平年値	1.1	0.1	4.4	0.2	0.1	0.1	
	(平均値／平年値)×100	63.6	200.0	525.0	650.0	0.0	200.0	
	発生程度	平年並	多	多	多	少	多	
概　評		やや多	多	多	やや多	-	-	