

平成11年 9月28日	植 防 情 報	発表	栃木県病害虫防除所
----------------	---------	----	-----------

病害虫発生予察注意報第1号


作物名：大豆・野菜
病害虫名：ハスモンヨトウ

- 1 発生予想 発生量 多い
発生地域 県内全域

2 根 拠

- (1) フェロモントラップへの誘殺数は、7月5半旬以降やや多い。
(2) 大豆、さといもを中心に、他の野菜などでも発生がみられる。
(3) これから発生の増加期にあたり、いちご・葉菜類を中心に被害の発生が予想される。

フェロモントラップでのハスモンヨトウの誘殺数



宇都宮市瓦谷町

3 対 策

- (1) 大豆、さといもなど、発生が多くなるので注意する。
(2) 雑草、なななどの幼虫は、発生が多くなるので注意する。
(3) 分散前の幼虫は、発生が多くなるので注意する。
(4) いちごなどの施設栽培などでは、開口部に寒冷紗を張り、侵入を防ぐ。
(5) 各作物ごとに「病害虫防除基準」に従い、若齢幼虫が集団でいる時期に薬剤散布を行う。
(6) (中齢以後の幼虫は、殺虫剤に対して著しく強い。また、老齢幼虫になると、昼間は地際などに潜んでいて、効果があがりにくい。)有機リン剤、合成ピレスロイド剤に対し、薬剤感受性の低下している個体群があるので注意する。

☆ハスモンヨトウに適用のある農薬一覧

系 統 名	作物名		いちご	はくさい	キャベツ	ブロッコリ	だいこん	レタス	大豆
	薬剤名								
有機リン剤 有機リン剤 カーバメート剤 IGR剤 IGR剤 IGR剤 BT剤 BT剤 その他	エルサン乳剤・パプチオン乳剤 DDVP乳剤 ラービンフロアブル アタブロン乳剤 カスケード乳剤 ノーモルト乳剤 デルフィン水和剤 レピタームフロアブル コテツフロアブル	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	

※ I G R 剤は効果がでるまでに数日かかります。

◇◇◇◇◇*****◇◇◇◇◇*****◇◇◇◇◇*****◇◇◇◇◇*****
詳しくは、病害虫防除所にお問い合わせください。

TEL 028-665-5645
FAX 028-665-6063