

いちご

単位：%

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	葉黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	アザミウマ類	アザミウマ類(花)	備考
ほ場率	発生ほ場数	6	4	13	11	3	51	17	0	6	8	総調査ほ場数：75か所 (アザミウマ類(花)調査ほ場数：24か所) 総調査株数：1,875株 (アザミウマ類(花)総調査花数：2,400花) (調査株数：1ほ場25株(アザミウマ類(花)調査花数：1ほ場100花))
	平均値	8.0	5.3	17.3	14.7	4.0	68.0	22.7	0.0	8.0	33.3	
	平年値	3.8	4.3	11.4	3.1	4.2	33.0	56.3	0.0	0.0	26.9	
	(平均値/平年値)×100	210.5	123.3	151.8	474.2	95.2	206.1	40.3	-	-	123.8	
株率	発生株数	2	1	16	3	3	592	22	0	13	19	アザミウマ類(花)の平年値は過去1年分のみ
	平均値	0.1	0.1	0.9	0.2	0.2	31.6	1.2	0.0	0.7	0.8	
	平年値	0.2	0.2	0.6	0.1	0.4	9.8	12.1	0.0	0.0	0.6	
	(平均値/平年値)×100	50.0	50.0	150.0	200.0	50.0	322.4	9.9	-	-	133.3	
概 評		やや少	やや少	やや多	多	やや少	多	少	少	-	前年並	

トマト

単位：%

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	オオタバコガ幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	8	0	0	4	3	5	0	0	3	0	0	0	0	総調査ほ場数：27か所 総調査株数：1,350株 (調査株数 50株)
	平均値	29.6	0.0	0.0	14.8	11.1	18.5	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	12.2	1.4	6.0	-	4.7	5.1	0.4	0.0	29.4	0.0	6.1	0.0	0.0	
	(平均値/平年値)×100	242.6	0.0	0.0	-	236.2	362.7	0.0	-	37.8	-	0.0	-	-	
株率	発生株数	15	0	0	14	56	8	0	0	9	0	0	0	0	
	平均値	1.1	0.0	0.0	1.0	4.1	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.8	0.1	0.4	-	1.5	0.2	0.0	0.0	2.9	0.0	0.8	0.0	0.0	
	(平均値/平年値)×100	137.5	0.0	0.0	-	273.3	300.0	-	-	24.1	-	0.0	-	-	
概 評		やや多	少	少	-	多	多	少	少	やや少	少	少	少	少	

きゅうり

単位：%

		灰色かび病	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病	モザイク病	黄化えそ病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	5	1	0	0	3	1	3	0	2	0	0	総調査ほ場数：9か所 総調査葉数：900葉 (調査葉数 100葉)
	平均値	0.0	0.0	55.6	11.1	0.0	0.0	33.3	11.1	33.3	0.0	22.2	0.0	0.0	
	平年値	3.3	24.2	44.6	10.7	0.0	0.0	-	2.5	4.3	1.0	15.7	0.0	0.0	
	(平均値/平年値)×100	0.0	0.0	124.7	103.7	-	-	-	444.0	774.4	0.0	141.4	-	-	
葉率	発生葉数	0	0	12	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	
	平均値	0.0	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
	平年値	0.1	3.6	7.0	0.7	0.0	0.0	-	0.2	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	
	(平均値/平年値)×100	0.0	0.0	18.6	28.6	-	-	-	0.0	50.0	-	12.5	-	-	
概 評		少	少	やや少	平年並	少	-	やや多	平年並	やや多	少	-	-	少	

にら

単位：%

		白葉葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	0	0	6	1	総調査ほ場数：16か所 総調査株数：800株 (調査株数 50株) ただし、ネダニ類については100株、アザミウマ類については25株調査とした
	平均値	6.3	0.0	0.0	0.0	37.5	6.3	
	平年値	11.3	6.0	0.0	0.7	5.4	4.0	
	(平均値/平年値)×100	55.8	0.0	-	0.0	694.4	157.5	
株率	発生株数	1	0	0	0	47	3	
	平均値	0.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.4	
	平年値	-	-	-	-	-	-	
	(平均値/平年値)×100	-	-	-	-	-	-	
概 評		やや少	少	少	少	多	-	

きく

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	3	1	4	1	0	0	総調査ほ場数：11か所 総調査株数：550株 (調査株数 50株)
	平均値	27.3	9.1	36.4	9.1	0.0	0.0	
	平年値	10.7	4.5	20.6	1.8	1.7	0.0	
	(平均値/平年値)×100	255.1	202.2	176.7	505.6	0.0	-	
	発生程度	多	多	やや多	多	少	少	
株率	発生株数	20	2	49	2	0	0	
	平均値	3.6	0.4	8.9	0.4	0.0	0.0	
	平年値	3.0	0.3	5.5	0.1	0.1	0.0	
	(平均値/平年値)×100	120.0	133.3	161.8	400.0	0.0	-	
	発生程度	平年並	平年並	やや多	多	少	少	
概 評		やや多	平年並	やや多	平年並	-	-	