

# 令和5年度病害虫発生予察注意報第2号

令和5年8月28日  
鳥取県病害虫防除所

## 注意報の概要

8月中旬現在、カメムシ類の発生量が多く、果樹全般において果実被害の発生が懸念される。今後、果樹園への飛来量が増加すると予想されるため、防除を徹底する必要がある。

## 病害虫名：果樹カメムシ類

- 1 対象作物 果樹全般
- 2 発生地域 県内全域
- 3 発生時期 平年並
- 4 発生量 多い

## 5 注意報発令の根拠

- (1) カメムシ類の予察灯における調査において、8月中旬より誘殺数が急増している。種や調査地点により誘殺状況はやや異なるが、全般的に発生量が多い（表1-1～3）。
- (2) 8月中旬現在、県予察ほ場（園芸試験場河原試験地）において、カキへの果実被害が確認されたが、果樹園全般におけるカメムシ類の飛来数は少ない。
- (3) 向こう1か月の気象予報（8月24日広島地方気象台発表）から、今後、カメムシ類の活動に好適な条件になると見込まれ、果樹園への飛来量の増加が予想される。

## 6 防除上注意すべき事項

- (1) カメムシ類の被害や飛来状況は、ほ場間差が大きいため、園内外をこまめに見回り、早期発見に努め、被害果実やカメムシ類の発生が多い場合は早急に防除を行う（ネオニコチノイド系又は合成ピレスロイド系殺虫剤のいずれかを選択）。特に、過去の多発生年に早期に被害を受けた地域では注意する。
- (2) 防除は、カメムシ類が飛来する夕方か早朝が効果的である。ただし、薬剤が乾きにくい気象条件では薬害が発生しやすいため、夕方散布を実施しない。また、カメムシ類は移動性が高いため、広域的な防除に努める。
- (3) 合成ピレスロイド系殺虫剤の多用は、カイガラムシ類及びハダニ類の発生を助長した事例があるので、必要最小限の使用にとどめる。
- (4) 各樹種の防除薬剤は表2を参考とする。また、農薬の使用基準を遵守するとともに、使用上の注意事項を守る。
- (5) 防除を行う際は、農作業安全に十分に注意する。

表 1-1 予察灯におけるチャバネアオカメムシの誘殺数

月・旬	八頭町**		鳥取市河原町		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	前年	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
7・上	12	438.0	23	152.4	32	-	33	150.5
・中	5	191.0	22	134.9	10	-	7	80.1
・下	13	314.0	46	189.2	44	-	69	89.7
8・上	16	307.9	102	288.3	195	-	110	193.8
・中	333	335.1	<u>837</u>	418.6	870	-	<u>1370</u>	353.1

表 1-2 予察灯におけるクサギカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		鳥取市河原町		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	前年	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
7・上	14	140.0	27	31.1	23	-	4	16.3
・中	18	109.0	22	62.1	11	-	1	18.9
・下	69	310.0	48	192.6	67	-	38	43.8
8・上	41	502.0	100	317.8	143	-	88	100.9
・中	<u>1442</u>	347.7	<u>456</u>	355.2	992	-	<u>258</u>	96.7

表 1-3 予察灯におけるツヤアオカメムシ誘殺数（頭）

月・旬	八頭町**		鳥取市河原町		湯梨浜町***		北栄町	
	本年	前年	本年	平年*	本年	平年*	本年	平年*
7・上	1	26.0	6	69.8	4	-	4	123.9
・中	6	43.0	1	66.3	3	-	3	60.1
・下	0	49.0	2	91.5	3	-	5	97.5
8・上	0	117.6	9	126.5	6	-	16	157.8
・中	15	105.4	82	153.6	124	-	78	122.6

\*平年：平成25年～令和4年の平均値、下線部は平年又は前年を上回る誘殺数を示す。

\*\*八頭町は令和3年度から調査地点を変更したため、平年ではなく前年の値を示す。

\*\*\*湯梨浜町は令和5年度から調査地点を変更したため、平年、前年値は未記載。



チャバネアオカメムシ成虫



クサギカメムシ成虫



ツヤアオカメムシ成虫

写真1 主要な果樹カメムシ類



ナシ‘王秋’の果実被害



カキ‘富有’の果実被害

写真2 果樹カメムシ類による果実被害（収穫期）

表2 果樹カメムシ類の主な防除薬剤と使用基準\*

作物名	農薬の名称	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回数	IRAC コード**	薬剤の系統
なし	ジノテフラン水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤 又はスタークル顆粒水溶剤)	2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内	4 A	ネニコチノイド系
	アクタラ顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内		
	シペルメトリン水和剤 (アグロスリン水和剤)	1,000 倍～ 2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内	3 A	合成ピレストイド系
	シペルメトリン水和剤 (イカズチWDG)	1,500 倍	収穫前日まで			
	テルスターフロアブル	3,000 倍～ 6,000 倍	収穫前日まで	2 回以内		
かき	ジノテフラン水溶剤*** (アルバリン顆粒水溶剤 又はスタークル顆粒水溶剤)	2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内	4 A	ネニコチノイド系
	クロラントラニリプロール ジノテフラン水和剤*** (キックオフ顆粒水和剤)	2,000 倍	収穫前日まで		ジノテフラン : 4 A クロラントラ ニリプロール : 28	
	アクタラ顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫3日前まで	3 回以内	4 A	ネニコチノイド系
	アグロスリン水和剤	1,000 倍～ 2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内	3 A	合成ピレストイド系
ぶどう	ジノテフラン水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤 又はスタークル顆粒水溶剤)	2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内	4 A	ネニコチノイド系
りんご	ジノテフラン水溶剤 (アルバリン顆粒水溶剤 又はスタークル顆粒水溶剤)	2,000 倍	収穫前日まで	3 回以内	4 A	ネニコチノイド系

\*農薬の登録内容は令和5年8月24日現在

\*\*IRAC コードは殺虫剤の作用機構の分類を示す。

\*\*\*ジノテフランを含む農薬の総使用回数は、4回以内（塗布は1回以内、散布は3回以内）

(お問い合わせ) 鳥取県病害虫防除所 (鳥取県園芸試験場内、TEL: 0858-37-4211)



この情報は、鳥取県病害虫防除所ホームページでも公開しています。

アドレスは、<http://www.jppn.ne.jp/tottori/> です

ホームページ2次元コード