

平成18年度 病害虫発生予察 指導情報

対象病害虫：ナシ黒斑病

平成19年 1月 5日

鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒斑病の越冬菌密度調査(平成19年)

市 町	短果枝の病芽率 (%)			一年生枝上の枝病斑数 (個/枝)			病 枝 率 (%)		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	3.3	2.9	4.5	0.1	0	0.3	10.3	4.5	19.8
鳥取市 2	0	0	2.0	0.0	0	0.7	3.3	4.2	32.4
鳥取市 3	3.0	1.5	2.5	0.5	0.4	0.3	25.8	24.0	21.2
八頭町 1	1.8	4.6	6.5	0.2	0.1	0.4	15.2	10.0	24.7
八頭町 2	1.7	1.7	-	0.1	0.1	-	12.9	10.0	-
湯梨浜町 1	0	1.6	1.5	0	0	0.0	4.0	0	3.0
湯梨浜町 2	1.5	1.7	-	0.3	0	-	21.7	0	-
倉吉市	0	0	1.1	0.1	0.1	1.0	6.3	6.3	28.3
北栄町	7.0	0	1.3	0.1	0.3	0.3	8.3	25.0	18.7
琴浦町 1	1.4	1.8	2.3	0.4	0.4	0.7	28.6	26.7	27.7
琴浦町 2	2.9	3.4	-	0	0	-	0	0	-
琴浦町 3	0	3.6	1.2	0	0.1	0.1	4.0	6.7	4.2
大山町 1	0	0	1.6	0.1	0.1	0.3	12.5	6.3	14.6
大山町 2	0	0	0	0.1	0.2	0.3	7.7	20.0	18.7
南部町	0	0	0	0	0	0.1	0	0	3.5
平 均	1.5	1.5	2.0	0.1	0.1	0.4	10.7	9.6	18.1

平年...平成9年～平成18年

<要約>

12月下旬に行ったナシ黒斑病の越冬菌密度調査の結果、短果枝の病芽率はほぼ平年並であった。また、一年生枝の枝病斑数及び病枝率は平年を下回った。