

平成20年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病 (No. 2)

平成20年6月24日
鳥取県病害虫防除所

表 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成20年)

地 区	新梢葉の発病率(%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本年	前年	平年	本年	前年	平年	本年	前年	平年
鳥取市1	4.5	3.3	2.1		42.2	8.7		64.8	28.8
鳥取市2	1.5	0	1.9		3.0	7.7		11.6	20.8
鳥取市3	4.5	1.8	1.4		6.4	8.6		2.0	16.5
八頭町1	0.5	1.5	1.3		6.4	4.3		16.7	14.0
八頭町2	0.9	2.6	-		3.3	-		8.1	-
湯梨浜町1	1.3	0	1.9		5.5	2.5		3.0	6.3
湯梨浜町2	2.8	0	-		1.1	-		0.7	-
倉吉市	1.0	0	1.8		1.2	5.5		0.8	20.4
園 試	2.3	0.4	0.8		18.0	4.9		26.7	12.4
琴浦町1	3.9	1.3	0.7		16.0	3.1		6.6	11.1
琴浦町2	2.0	1.3	-		4.1	-		1.5	-
琴浦町3	1.1	0	0.5		6.1	0.5		1.8	5.2
大山町1	0.6	0.4	0.3		7.4	2.1		4.7	7.2
大山町2	1.8	0.8	0.6		1.3	3.3		0.4	7.9
南部町	3.1	0.9	0.2		2.3	0.8		1.2	4.8
平 均	2.1	1.0	1.1		8.3	4.3		10.0	13.0

平年...平成10～19年
1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査

<要約>

6月20日における新梢葉の平均発病率は2.1%(平年:1.1%)であり、平年を上回った。