

平成20年度病害虫発生予察指導情報  
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成20年9月22日  
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の新梢葉の発病状況(平成20年)

地 区	新 梢 葉 の 発 病 率 (%)								
	6 月			7 月			9 月		
	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
鳥取市 1	4.5	3.3	2.1	16.9	42.2	11.0	27.7	64.8	26.4
鳥取市 2	1.5	0	1.9	0.9	3.0	4.7	4.0	2.0	11.5
鳥取市 3	4.5	1.8	1.4	6.8	6.4	8.3	11.5	11.6	15.7
八頭町 1	0.5	1.5	1.3	0.4	6.4	4.2	0.4	16.7	8.9
八頭町 2	0.9	2.6	-	0.4	3.3	-	7.2	8.1	-
湯梨浜町 1	1.3	0	1.9	0.7	5.5	2.5	2.8	3.0	2.5
湯梨浜町 2	2.8	0	-	0.4	1.1	-	1.3	0.7	-
倉吉市	1.0	0	1.8	1.1	1.2	3.1	3.3	0.8	11.0
園 試	2.3	0.4	0.8	3.9	18.0	6.6	12.6	26.7	12.8
琴浦町 1	3.9	1.3	0.7	9.8	16.0	4.2	34.4	6.6	8.8
琴浦町 2	2.0	1.3	-	2.1	4.1	-	4.9	1.5	-
琴浦町 3	1.1	0	0.5	1.4	6.1	1.0	2.5	1.8	2.8
大山町 1	0.6	0.4	0.3	0.7	7.4	1.6	2.7	4.7	3.9
大山町 2	1.8	0.8	0.6	0.7	1.3	3.0	1.4	0.4	6.1
南部町	3.1	0.9	0.2	0.4	2.3	1.0	1.4	1.2	4.6
平 均	2.1	1.0	1.1	3.1	8.3	4.3	7.9	10.0	9.6

平年...平成10～19年  
1園当たり10新梢について全葉数及び病葉数を調査

<要約>  
9月18、19日における新梢葉の平均発病率は7.9%（平年：9.6%）であり、ほぼ平年並であった。