

病害虫発生予察指導情報

(ナシ・クワコナカイガラムシ No. 2)

平成24年7月9日
鳥取県病害虫防除所

1. 情報の内容

クワコナカイガラムシ第1世代幼虫のふ化が平年より2日遅い7月7日(平年:7月5日)に始まった。昨年、果実被害が多く認められた園では防除を徹底する必要がある。

2. 情報の根拠

- (1) クワコナカイガラムシ第1世代幼虫のふ化が平年より2日遅い7月7日(平年:7月5日)に認められた。
- (2) 向こう1か月の気象予報から、第1世代幼虫のふ化最盛日は、平年よりやや遅い7月11日前後(平年:7月9日)と見込まれる。

3. 防除上注意すべき事項

- (1) 昨年被害の多かった園及び多発園では、5～10日間隔で発生状況を確認しながら次の時期を目安に2回の防除を行う。

幼虫ふ化最盛期	7月11～15日
幼虫ふ化終期	7月16～22日

少発園では7月15日前後に1回防除を行う。
- (2) 薬剤はモスピラン水溶剤(またはモスピラン顆粒水溶剤)4,000倍液、ダズバンDF 4,000倍液、スミチオン乳剤1,500倍液などを使用し、連用を避けて輪番散布する。
- (3) 薬剤の散布にあたっては、カイガラムシが集合する枝葉の他、枝の切り口、粗皮などにも十分にかかるようにする。
- (4) 農薬の散布にあたっては、農薬の使用基準を遵守する。