

ナシ・ハダニ類発生状況調査結果

平成25年7月25日
鳥取県病害虫防除所

寄生葉率(%)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本年	前年	平年*	本年	前年	平年	本年	前年	平年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	5.0	0	21.7	0	0	4.0	0	0	1.8
鳥取市青谷町	0	0	12.2	0	0	5.2	0	0	0.0
八頭町	0	0	7.3	0	0	1.0	0	0	0.2
倉吉市	0	0	1.0	0	0	0.8	0	0	0.0
湯梨浜町別所	0	5.0	2.3	0	8.3	1.8	0	3.3	4.7
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0	3.3	11.3	0	46.7	7.7	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	1.8	0	0	1.5	0	0	0.3
南部町	0	0	2.2	0	0	1.3	0	0	0.0
平均	0.6	0.9	8.0	0	6.1	2.6	0	0.4	0.8

* 平年値:平成15～24年

** 平年値:平成22～24年

10葉当たり寄生頭数(頭/10葉)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本年	前年	平年*	本年	前年	平年	本年	前年	平年
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0.2	0	8.3	0	0	1.4	0	0	0.5
鳥取市青谷町	0	0	5.9	0	0	1.9	0	0	0.0
八頭町	0	0	9.6	0	0	0.2	0	0	0.1
倉吉市	0	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0.0
湯梨浜町別所	0	1.2	0.4	0	1.3	0.4	0	0.3	1.1
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0	0.5	3.7	0	18.5	2.9	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	0.5	0	0	0.4	0	0	0.1
南部町	0	0	0.5	0	0	0.3	0	0	0.0
平均	0.0	0.2	3.2	0	2.2	0.8	0	0.0	0.2

* 平年値:平成15～24年

** 平年値:平成22～24年

(概要)

- ・調査は7月24日に実施。調査地点は黒斑病と共通。
- ・クワオオハダニの発生は平年と比較してやや少ない。
- ・カンザワハダニ、ナミハダニは発生が確認できなかった。
- ・ハダニ類の寄生は確認できないものの、葉焼け症状が散見された。