

# 平成25年病虫害発生予察指導情報

対象病虫害：ナシ黒星病

平成25年5月28日

鳥取県病虫害防除所

表1 ナシ黒星病巡回調結果

地区名		発病葉率 (%)		発病果率 (%)	
		本年	平年*1	本年	平年*1
東部	鳥取市①	0	0.4	0	0
	鳥取市②	0	0.3	0	0
	鳥取市③	0	3.4	0.3	0.2
	鳥取市④	0	0	0	0
	八頭町	0	0	0	0
中部	湯梨浜町	2.2	10.0	3.7	1.1
	倉吉市①	0	0	0	0
	倉吉市②	0	0	0	0
	北栄町	0	0.1	0	0
	琴浦町	0	0	0	0
西部	大山町	1.4	0.6	0	0.5
	米子市	4.1	1.8	0.3	0.2
	南部町	0	0	0	0.0
平均		0.6	1.3	0.3	0.2

注) \*1 調査地点により調査年数が異なるため、H15～24年の期間のうち2年以上（最大10年）の調査結果をもとに平年値を算出した。

\*2 「—」は調査対象園の樹の伐採のため調査未実施

- ・1圃場当たり300果、30果そのの全葉を調査
- ・調査対象はすべて赤ナシである

【概要】・果そう葉における発病は平年と比べてやや少なかった。

・幼果における発病はほぼ平年並であった。

【対策】・発病した葉及び果実は取り除き、園外で処分する。

・多発園では、EBI剤（アンビルフロアブル、スコア顆粒水和剤、オンリーワンフロアブルなど）の追加防除を行う。EBI剤の散布時には、耐性菌の発達を避けるためチウラム水和剤、ベルコートフロアブルなどの殺菌剤を混用することが望ましい。