

## ナシ・ハダニ類発生状況調査結果

平成28年7月25日  
鳥取県病害虫防除所

寄生葉率(%)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本年	前年	平年*	本年	前年	平年	本年	前年	平年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
鳥取市佐治町	0	3.3	17.5	45.0	31.7	4.3	0	0	1.8
鳥取市青谷町	0	1.7	1.7	25.0	10.0	2.0	0	0	0.0
八頭町	0	1.7	7.3	0	18.3	2.2	0	5.0	0.7
倉吉市	0	0	0.2	0	0	0.0	1.7	0	0.0
湯梨浜町別所	0	30.0	5.5	16.7	10.0	2.7	0	0	4.8
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0	45.0	13.3	0	13.3	7.2	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	0.7	0	0	0.2	0	0	0.0
南部町	0	0	0.8	0	0	0.2	0	0	0.0
平均	0	9.1	6.4	9.6	9.3	2.1	0.2	0.6	0.8

\* 平年値:平成18～27年

\*\* 平年値:平成22～27年

10葉当たり寄生頭数(頭/10葉)

調査地点	クワオオハダニ			カンザワハダニ			ナミハダニ		
	本年	前年	平年*	本年	前年	平年	本年	前年	平年
	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
鳥取市佐治町	0	0.3	5.5	8.5	4.7	0.8	0	0	0.5
鳥取市青谷町	0	0.2	0.3	2.8	2.5	0.4	0	0	0.0
八頭町	0	0.2	9.1	0	2.0	0.2	0	1.3	0.2
倉吉市	0	0	0.0	0	0	0.0	0.5	0	0.0
湯梨浜町別所	0	4.0	0.8	2.5	1.7	0.5	0	0	1.1
北栄町**	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
琴浦町竹ノ内	0	15.3	4.3	0	2.5	2.8	0	0	0.0
大山町坪田	0	0	0.2	0	0	0.1	0	0	0.0
南部町	0	0	0.2	0	0	0.0	0	0	0.0
平均	0	2.2	2.3	1.5	1.5	0.5	0.1	0.1	0.2

\* 平年値:平成18～27年

\*\* 平年値:平成22～27年

(概要)

- ・調査は7月22日に実施。調査地点は黒斑病と共通。
- ・ハダニ類の発生量は、ほぼ平年並で、前年と比較してやや少ない。  
 [クワオオハダニ] 前年比:少ない、平年比:少ない  
 [カンザワハダニ] 前年比:並、平年比:やや多い  
 [ナミハダニ] 前年比:並、平年比:並