

平成30年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病

平成30年5月1日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の果実における発病率（平成30年）

地 区	ポリ袋検定法による			被袋果実の発病率(%)					
	幼果の発病率 ¹⁾ (%)			6 月			7 月		
	本年	前年	平年 ²⁾	本年	前年	平年	本年	前年	平年
河原町	2.0	1.7	0.2 ³⁾						
佐治町	6.0	3.5	0.7						
青谷町	4.0	4.2	7.4						
八頭町	0	1.7	0.4						
湯梨浜町（別所）	2.0	0	0.2						
湯梨浜町（勝負谷）	2.0	2.6	0.2						
関金町	1.0	2.5	0.4						
北栄町（園試）	2.0	1.7	3.0						
琴浦町	4.0	0.8	0.6						
大山町（中山）	1.0	3.3	0.2						
大山町（名和）	2.0	4.5	0.4						
南部町	1.0	0.9	0.2						
平均	2.3	2.3	1.2						

(注)

¹⁾ 1園当り100果について調査(試料採取：4月21日、22日、24日、25日、採集後23℃に3日間静置後、発病果率を調査)

²⁾ 平成20～29年の平均値

³⁾ 平成22～29年の平均値

<要約>

幼果の平均発病果率は2.3%（平年：1.2%）であり、平年並の発生量であったが、発生地点数は多い傾向であった。