

平成31年度病害虫発生予察指導情報

対象病害虫：ナシ黒星病（No. 1）

平成31年3月27日
鳥取県病害虫防除所

表1 病落葉からの子のう胞子飛散状況（調査地点：鳥取県園芸試験場）

単位：個

月・半月	静置式			(参考) 吸引式	
	平成31年	平成30年	平年 (H21~30)	平成31年	平成30年
3・5	0	0	-	19	0
3・6		0	0.1		0
4・1		0	0.1		12
4・2		0	2.5		4
4・3		0	3.8		6
4・4		0	1.2		0
4・5		1	2.6		14
4・6		0	1.6		0
5・1		0	0.7		1
5・2		0	0.6		0
5・3		0	0.4		0
5・4		0	0.5		0
5・5		0	0		0
5・6		0	0		0

注) ーは欠側。静置式は従来式調査方法。吸引式は試験中の改良型調査方法。

表2 果（花）そう基部病斑からの分生胞子飛散状況
（調査地点：鳥取県園芸試験場）

単位：個

月・半月	平成31年	平成30年	平年 (H21~30)
3・5	6.6	4.2	-
3・6		0*	5.5
4・1		9.1	7.5
4・2		14.9	5.5
4・3		1.1	9.2
4・4		0*	3.5
4・5		69.0	10.9
4・6		0*	5.5
5・1		13.8	1.5
5・2		0	2.1
5・3		5.6	1.4
5・4		17.2	12.1
5・5		4.2	61.0
5・6		0.0	13.6

注) ーは欠側。*は無降水のため調査未実施。

<情報の内容>

3月第5半月調査結果

- ・病落葉からの子のう胞子の飛散は、静置式は認められなかったが、吸引式は認められた。
- ・花そう基部からの分生胞子の飛散が認められた。

<参考>

- ・子のう胞子採集方法
病落葉（前年採取）上に設置した静置式胞子採集器内にグリセリンゼリーを塗布したスライドガラスを静置（24時間）し、スライドガラスに付着した胞子数を調査した。
- ・分生胞子採集方法
雨滴法（ロートを罹病した腋花芽の下に設置）により採取した雨滴中の胞子数を降雨日ごとに調査した。