

# 病害虫発生予察指導情報 (ナシ・クワコナカイガラムシNo. 1)

令和2年5月7日  
鳥取県病害虫防除所

## 1. 情報の内容

クワコナカイガラムシ越冬卵からのふ化開始は、平年より3日遅い5月6日(平年:5月3日)に認められました。昨年、果実被害が多く認められた園では防除を徹底して下さい。

## 2. 情報の根拠

- (1) クワコナカイガラムシ卵のうからの越冬世代幼虫のふ化\*開始は、平年より3日遅い5月6日(平年:5月3日)に認められた。
- (2) 卵のう内のふ化の様子及び今後の気象経過などから、越冬世代幼虫のふ化最盛日は5月11日前後(平年:5月9日)と見込まれる。

\*クワコナカイガラムシ越冬卵からのふ化は、百葉箱内(園試)で観察。越冬卵をシャーレ中央に静置し、越冬卵周囲に粘着物質を塗布、その粘着物質に捕獲された幼虫数を計数。

## 3. 防除上注意すべき事項

- (1) 昨年被害が多かった園では、必ず2回防除を行う。特に、越冬世代は、第1世代及び第2世代よりふ化時期が揃いやすいので防除を徹底する。
- (2) 昨年度多発した園等では、5~7日間隔で以下の時期を目安に2回の防除を行う。
  - ・幼虫ふ化最盛期 5月 11 ~ 15日
  - ・幼虫ふ化終期 5月 16 ~ 20日
- (3) 薬剤はスプラサイド水和剤1,500倍液、アプロード水和剤1,000倍液などを使用する。
- (4) 薬剤の散布にあたっては、クワコナカイガラムシが集合する枝葉の他、枝の切り口及び粗皮下などに薬剤が十分かかるようにする。
- (5) 農薬の散布にあたっては、農薬の使用基準を遵守する。