

# 令和4年病害虫発生予察指導情報

## 対象病害虫：ナシ黒星病

令和4年6月27日  
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒星病巡回調査結果（6月16、20、21日調査）

地区名		発病葉率 (%)		発病果率 (%)	
		本年	平年 <sup>1)</sup>	本年	平年 <sup>1)</sup>
東部	久末	0	1.4	0	0.3
	佐治町①	0	0.1	0	0.1
	佐治町②	0	0.1	0	0.2
	青谷町	5.5	1.1	0	0
	八頭町	1.6	1.5	0	— <sup>2),3)</sup>
中部	湯梨浜町	0	0.2	0.7	0
	倅谷	0.5	0.1	0	0
	関金町	7.5	6.5	— <sup>2)</sup>	5.7
	北栄町（園試）	0	0.1	0	0
	琴浦町	0	0.2	0	0.1
西部	大山町	4.2	0.8	0	0.7
	淀江町	4.4	0.4	— <sup>2)</sup>	0.2
	南部町	0.9	0.0	0.7	0.0
平均		1.9	1.0	0.1	0.6

注) 1) 調査地点により調査年数が異なるため、H24～R3年の期間のうち2年以上（最大10年）の調査結果をもとに平年値を算出した。

2) 被袋済であり、調査が行えなかった。

3) 令和2年から調査品種を変更。

- ・ 1圃場当り 300果、30果そのの全葉を調査
- ・ 調査対象はすべて赤ナンである

**【概要】** ・ 果そう葉における平均発病葉率は1.9%（平年：1.0%）と平年に比べてやや高かった。  
 ・ 果実における平均発病果率は0.1%（平年：0.6%）と平年に比べてやや低かった。

**【対策】** ・ 発生量の多い園では、発病した葉及び果実の切除処分を早急を実施する。  
 ・ 多発園では追加防除を検討する。