

令和5年度病害虫発生予察指導情報
対象病害虫：ナシ黒斑病

令和5年5月17日
鳥取県病害虫防除所

表1 ナシ黒斑病の果実における発病率（令和5年）

地 区	ポリ袋検定法による			被袋果実の発病率(%)					
	幼果の発病率 ¹⁾ (%)			6 月			7 月		
	本 年	前 年	平 年 ²⁾	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
河原町	0	- ⁵⁾	- ⁶⁾		0	- ⁶⁾		0	- ⁶⁾
佐治町	0	0	- ³⁾		0	- ³⁾		0	- ³⁾
青谷町	1.0	2.0	0.8 ⁴⁾		1.7	⁴⁾		3.3	⁴⁾
八頭町	0	0	0.3		0			0	
湯梨浜町（別所）	0	0	0.5		0			0	
湯梨浜町（勝負谷）	0	0	1.0		0			0	
倉吉市	0	0	0.5		1.7			6.7	
北栄町（園試）	0	4.0	1.2		1.7			8.3	
琴浦町	0	0	0.9		0			0	
南部町	0	0	0.5 ⁴⁾		0	⁴⁾		0	⁴⁾
平 均	0.1	0.7	0.7		0.5			1.8	

(注)

¹⁾ 1園当たり100果について調査(試料採取：4月14～25日。採取後25℃に静置し、3日目に調査。その後、発病果率を算出)

²⁾ 平成25～令和4年の平均値。

³⁾ 令和3年より調査地点を変更した。

⁴⁾ 令和元年より調査地点を変更した。

⁵⁾ 伐採により調査できなかった。

⁶⁾ 令和4年6月から調査園を変更。

<要約>

幼果の平均発病果率は0.1%（平年：0.7%）であり、平年に比べてやや低かった。