

平成24年度病害虫発生予報第11号

平成25年2月7日
鳥取県病害虫防除所

予報の概要

区分	農作物名	病害虫名	発生時期	予想発生量
野菜	ラッキョウ	白色疫病	平年並	平年並

気象予報（抜粋）


1か月予報（2月2日～3月1日：2月1日、広島地方気象台発表）

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。


平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いでしょう。向こう1か月の平均気温は、平年並みまたは高い確率ともに40%です。降水量は多い確立50%です。

週別の気温は、1週目は高い確立60%です。

<向こう1か月の気温、降水量の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



野菜

[ラッキョウ]

1 白色疫病

(1) 予報の内容

発生時期 平 年 並

発生量 平 年 並

(2) 予報の根拠

ア 1月下旬現在、県東部～中部の現地ほ場における発生量、発生時期ともほぼ平年並であった。

イ 本病は、降雪後の雪解け水や連続降雨により、発病が急速に広がりやすい。

ウ 昨年が発生ほ場や、積雪の多い場所では、局所的に多発するおそれがある。

エ 向こう1か月の気象予報によると、本病の発生にやや好適な条件が続くものと予想される。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 本病の発生が認められる場合は、フォリオゴールド1,000倍液又はホライズンドライフロアブル1,000倍液を、機能性展着剤を加用して茎葉にムラなく散布する。

イ 2～3月の後期発生を予防するため、雪解け直後や連続降雨時の雨の止み間などに、フロンサイド水和剤1,000倍液を機能性展着剤を加用して散布する。

ウ 罹病株は伝染源となるので、ほ場外に持ち出し処分する。

[おしらせ]

農薬の使用に当たっては、農薬使用基準を遵守するとともに、周辺への飛散には十分注意しましょう。

農薬の詳しい登録内容は、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターの「農薬登録情報検索システム」から検索できます。(<http://www.famic.go.jp/>)

なお、農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ず御確認ください。

< 鳥取県病害虫防除所ホームページ >

アドレス <http://www.jppn.ne.jp/tottori/>

病害虫発生予察情報、フェロモントラップ調査結果(ナシのシンクイムシ類)などの参考情報、病害虫の診断方法などの情報をお知らせしていますので、ご利用下さい。

< お問い合わせ >

普通作物関係：〒680-1142 鳥取市橋本 260

鳥取県病害虫防除所

(TEL : 0857-53-1345、E-mail : boujyot@titan.ocn.ne.jp)

もしくは

鳥取県農林総合研究所農業試験場環境研究室

(TEL : 0857-53-0721、FAX : 0857-53-0723)

果樹・野菜・花き関係

〒689-2221 東伯郡北栄町由良宿 2048

鳥取県農林総合研究所園芸試験場環境研究室

(TEL : 0858-37-4211、FAX : 0858-37-4822)

予報第12号の発表は、3月7日(木)の予定です。