

都道府県が設定している要防除水準（野菜）

（2022年度調べ）

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
かんしょ	イモゾウムシ	植付後75日～105日 (15日おき)	見取り調査、1圃場あたり50 茎	被害莖率5%以上	即時	被害許容水準を、植え 付け後75日で被害塊 根率13.6%とした 場合	沖縄県
かんしょ	ハスモンヨトウ	8月下旬	見取り調査	幼虫10頭/平方メートル以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
さといも	ハスモンヨトウ	随時	見取り調査	幼虫3頭/株以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
ごぼう	キタネコブセンチュウ	播種前	ベルマン法（土壌25gあた り）	2～3頭以上	播種前		北海道
ごぼう	キタネグサレセンチュ ウ	播種前	ベルマン法（土壌25gあた り）	5頭以上	播種前		北海道
ごぼう	黒条病	畝間が茎葉で隠れるよう になったら観察を開始	50株程度	1株以上（初発を確認したら）	即時	効率的防除対策の開始 目安	北海道
だいこん	キタネグサレセンチュ ウ	作付前	1圃場あたり任意の土壌30g ×4ヶ所について、センチュウ 数（ベルマン法）を顕微鏡に より調査	土壌30gあたり1頭以上検出	即時		岡山県
だいこん	キタネグサレセンチュ ウ	播種前	ベルマン法（土壌25gあた り）	10頭以上	播種前		北海道
だいこん	ネグサレセンチュウ類	播種前	生土50gあたりのネグサレセ ンチュウ類の頭数を調査	生土50gあたり2～3頭	播種前		青森県
だいこん	バーテシリウム黒点病	播種前	土壌採取	中発生以上のほ場および微小菌 核密度10個/g乾土以上のほ 場	播種前		北海道
てんさい	テンサイモグリハナバ エ	12葉期（道東地域で6 月20日頃）	見歩き調査（最低50株）	被害株率100%、さらに食害 面積1/4を超える葉が5枚/ 株（被害葉率42%）以上	即時		北海道

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
てんさい	ヨトウガ (第1世代)	幼虫被害発生初期 (道央地帯で6月下旬)	見歩き調査、1圃場あたり50株 (10株×5ヶ所、5日間隔)	被害株率50%以上	即時		北海道
てんさい	ヨトウガ (第2世代)	幼虫被害発生初期 (道央地帯で8月下旬から)	見歩き調査、1圃場あたり50株 (10株×5ヶ所、5日間隔)	被害株率50%以上	即時		北海道
にんじん	キタネコブセンチュウ	播種前	ベルマン法 (土壌25gあたり)	2~3頭以上	播種前		北海道
にんじん	キタネグサレセンチュウ	播種前	ベルマン法 (土壌25gあたり)	5頭以上	播種前		北海道
たまねぎ	ネギアザミウマ	随時	見取り調査	50頭/株以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
たまねぎ	ネギアザミウマ	4月~5月	見取り調査	50頭/株以上	即時		山口県
たまねぎ	ネギアザミウマ	6月上旬から	見取り調査 (10~20株、5日間隔)	食害程度指数2.5 (大多数の株にわずかな食害が認められる)・食害程度指数2.5に満たない場合は7月10日	1回目:即時・以降10日間隔で7月20日まで	発生対応型防除体系:防除開始期の目安	北海道
たまねぎ	白斑葉枯病	6月上旬から	見取り調査 (生育の良い畦を片道100株 (畦長12m) 往復200株調査)	明瞭な病斑の出現	1回目:初発確認後直ちに (初発の5日以内)・2回目以降:15日間隔・散布終了時期:倒伏期の15日前	発生対応型防除体系:防除開始期の目安	北海道
たまねぎ	べと病	3月	見取り調査	10aあたり越冬罹病株3株以上 (越冬罹病株率0.01%以上)	3月下旬~4月上旬	(要防除密度の目安)	兵庫県
たまねぎ	べと病	3月	見取り調査	越冬罹病株数が2~3株/10a以上	3月下旬~4月		山口県
ラッキョウ	ネダニ類	越冬後 (3月下旬)	土200gを採取しオニオンパウダートラップ3枚を設置し、3日後の誘引数を調査	3頭/トラップ	生育期 (4月中旬~下旬)		福井県
根深ねぎ	ネギアザミウマ	収穫60日前	見取り調査	被害葉率50%以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
根深ねぎ	ネギハモグリバエ	収穫60日前	見取り調査	被害葉率50%以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
小豆	ダイズシストセンチュウ	播種前	土壌採取	卵・幼虫数/g乾土が10~100	播種前	卵・幼虫数/g乾土が100以上では寄主作物の作付けを避ける	北海道
だいず	カメムシ類	8月下旬(圃場侵入期)	見取り調査、圃場あたり100茎ずつ3ヶ所	0.3頭/100茎	即時		福井県
だいず	子実吸汁性カメムシ類	8月下旬(若莢期・カメムシ類の圃場侵入期)	見取り調査	100株あたり0.3頭以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
だいず	カメムシ類	9月中旬(発生最盛期)	見取り調査、圃場あたり100茎ずつ3ヶ所	4.0頭/100茎	即時		福井県
だいず	子実吸汁性カメムシ類	9月中旬(莢伸長後期・カメムシ類の最多発生期)	見取り調査	100株あたり4頭以上	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
だいず	フタスジヒメハムシ	8月下旬(成虫発生最盛期)	払い落とし調査、1.5m×2条の株を3ヶ所以上	約70頭/1.5m×2条株	即時		福井県
大豆	マメシンクイガ(圃場単位)	6月下旬頃	大豆の連作圃場の有無	地区全体で連作圃場がない場合は防除不要			新潟県
大豆	マメシンクイガ(圃場単位)	8月中~下旬	圃場内に性フェロモントラップ1台を設置、誘殺数	8月10日頃~25日の総誘殺数10頭以上:多発生に対応した防除必要	8月第6半旬~9月第2半旬		新潟県
大豆	マメシンクイガ(圃場単位)	8月中~下旬	圃場内に性フェロモントラップ1台を設置、誘殺数	8月10日頃~31日の総誘殺数15頭以上:防除必要	9月第1~2半旬		新潟県
大豆	マメシンクイガ(圃場単位)	前年の収穫時	-	大豆連作圃場で、前年に被害粒が目立った場合、多発生に対応した防除必要	8月第6半旬~9月第2半旬		新潟県

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
だいず	マメシクタイガ	開花前以降（フェロモン トラップ）、開花始め7 日後以降（莢長）	フェロモントラップ・莢長調査	成虫の誘殺が開始している・お よそ半数の株で莢長が2～3 c mに達している	条件を満たしたことを 確認後6日後を目処 に、1回目散布：合成 ピレスロイド剤、10 日後の2回目散布：有 機リン剤	防除開始期の目安	北海道
大豆	ウコンノメイガ（圃場 単位）	7月第5半旬、7月第6 半旬	平均的な生育の地点4か所、1 か所当たり畝1mの見取り調 査、葉巻数	7月第5半旬の平均葉巻数6個 以上、7月第6半旬の平均葉巻 数24個以上防除必要	7月第6半旬～8月第 1半旬		新潟県
大豆	ウコンノメイガ	7月6半旬	見取り調査、1圃場あたり4ヶ 所・連続5～10本について調 査	葉巻数6個以上／本（一部開 いた葉巻も1葉巻と数える）	即時～8月1半旬		富山県
大豆	ウコンノメイガ	7月6半旬	ほ場全体で40～60茎の葉巻 数を調査し、茎当たり葉巻数を 算出	葉巻数1.3個／茎以上	7月6半旬～8月上旬	茎葉散布剤	秋田県
大豆	ウコンノメイガ	7月第6半旬	葉面積指数の大きな地点を25 茎調査	葉巻数3個以上／茎	8月第1半旬までに防 除	平成24年度岩手県農 業研究センター試験研 究成果	岩手県
大豆	ウコンノメイガ	8月第1半旬	見取り調査	減収率5%を被害許容水準とし た場合：葉巻率1.6%または 1本当たり葉巻数1.3個	即時	他の減収率（10%、 15%、20%）を被 害許容水準として要防 除水準を設定すること もできる。	宮城県
だいず	食葉性害虫	開花始～	見取り調査	7月上旬：1頭／株・開花期： 2頭／株・莢伸長最盛期以降： 3～4頭／株	即時		北海道
だいず	ハスモンヨトウ	－	見取り調査	白変葉が5ヶ所／1a以上	即時		山口県
だいず	ハスモンヨトウ	8月上旬～中旬	圃場内の白変葉ヶ所を見取り調 査	白変葉ヶ所数 5ヶ所／a	即時		鳥取県

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
だいず	べと病	開花始まで	見取り調査（上位葉）	病斑面積率2.5%（病斑数30個/株）以上	開花2～3週間前に達した場合：即時及びその2～3週間後の2回		北海道
だいず	べと病	開花始まで	見取り調査（上位葉）	病斑面積率2.5%（病斑数30個/株）以上	開花始に達した場合：開花期の1回		北海道
だいず	べと病	開花始まで	見取り調査（上位葉）	病斑面積率2.5%（病斑数30個/株）以上	開花始までに要防除水準に達しなかった場合：（黄・青白大豆）防除不要、（黒大豆）開花期の1回散布		北海道
さやえんどう	ナモグリバエ	定植後	見取り調査（ほ場内3ヶ所程度10m範囲の株）	成虫の食痕（15～20個/上位葉3葉）の茎が主茎20茎当たり1茎以上	即時	収穫期間の発生対応型防除の目安	北海道
きゅうり	サツマイモネコブセンチュウ	定植前	ベルマン法（土壌25gあたり）	2期幼虫数2頭以上、根こぶ程度40以上	定植前		北海道
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	随時	見取り調査	4頭/葉	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
夏秋キュウリ	アブラムシ類	6月上旬～6月下旬	見取り調査、任意	葉当たり10頭以上の寄生葉率が10%	即時		福島県
きゅうり	ワタアブラムシ	随時	見取り調査	6頭/葉	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
かぼちゃ	ワタアブラムシ	7月	中位葉の1葉あたり平均寄生頭数	150頭（径2～3cmのコロニーが3個）以上	即時茎葉散布を開始する	効率手防除の開始目安	北海道
すいか	ハダニ	着果期	見取り調査	寄生葉率30%または2頭/小葉以上	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
すいか	ハダニ	果実肥大期	見取り調査	寄生葉率64%または10頭/小葉以上	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
すいか	ナミハダニ	果実肥大初期～収穫盛期	上、中、下葉各5葉ずつ雌成虫寄生数を調査する	5.4頭/葉/日	即時	被害許容水準を5%減収とした場合	和歌山県
トマト	サツマイモネコブセンチュウ	定植前	ベルマン法（土壌25gあたり）	2期幼虫数2頭以上、根こぶ程度40以上	定植前		北海道

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
トマト	オンシツコナジラミ	随時	黄色粘着リボンによる捕獲	1日あたり捕獲数36頭以上	即時	果実のすす病発生開始の目安（要防除密度の目安）	兵庫県
トマト	オンシツコナジラミ	随時	見取り調査	1葉あたり60頭以上	即時	果実のすす病発生率10%の目安（要防除密度の目安）	兵庫県
トマト	タバココナジラミ	随時	見取り調査	幼虫数が1葉あたり80頭以上	即時	被害が生じる密度【果実着色異常】（要防除密度の目安）	兵庫県
トマト	マメハモグリバエ	随時	見取り調査	幼虫30頭/株以上	即時	10%減収の目安（要防除密度の目安）	兵庫県
トマト	褐色根腐病	栽培終了後	根の掘取り	根の半分以上が発病している	次作に向けて	土壌還元消毒や抵抗性台木を利用する	北海道
なす	ハダニ	随時	見取り調査	施設栽培：5頭/葉、露地栽培：2頭/葉	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
なす	ミナミキイロアザミウマ	随時	見取り調査	1頭/10葉	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
なす（施設）	ミナミキイロアザミウマ	生育期～収穫期	100葉あたりの成・幼虫数を調査する	86頭/100葉	即時	被害許容水準を5%減収とした場合	和歌山県
なす	モモアカアブラムシ	随時	見取り調査	50頭/葉	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
なす	ハスモンヨトウ	随時	フェロモントラップによる誘殺	旬あたり150頭以上	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
ピーマン	ミカンキイロアザミウマ	随時	黄色粘着トラップ（7.5cm×12.5cm）による誘殺	10頭/日	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	随時	見取り調査	1頭/10花	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	全期間	成虫数、見取り（50花）	0.1頭/花	即時	数値は被害許容水準	宮崎県

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
ピーマン（施設）	ミナミキイロアザミウマ	開花期～収穫期	100花あたりの成虫数を調査する	10.5頭/100花	即時	被害許容水準を5%減収とした場合	和歌山県
ピーマン	ハスモンヨトウ	随時	見取り調査	3齢幼虫4頭/10平方メートル	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
ピーマン	ハスモンヨトウ	随時	フェロモントラップによる誘殺	150頭/旬	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
チンゲンサイ	コナガ	随時	見取り調査	1頭/10株以上	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
キャベツ（春まき栽培）	コナガ	定植期以降	フェロモントラップによる誘殺数及び5日間（前4日間を含む）のアメダスの移動平均気温	5日間成虫数30頭以上且つ移動平均気温15℃以上が2日以上連続	2日後までに開始		北海道
キャベツ	コナガ	結球前	見取り調査	幼虫数が1株あたり1.3頭以上	即時	（要防除密度の目安）	兵庫県
キャベツ	コナガ	生育前期（結球前）	幼虫数を見取り調査する	5.0頭/株	即時	結球率100%を目標とする場合	和歌山県
キャベツ	コナガ	生育後期（結球期）	幼虫数を見取り調査する	0.77頭/株	即時	収穫時の秀品率95%を目標とする場合	和歌山県
キャベツ	食葉性害虫	定植期以降	見取り調査（約10株、7日間隔）	新食害痕数1個/株以上	即時		北海道
ハウレンソウ	ハウレンソウケナガコナダニ	は種前～は種後	トラップ調査（コナダニ見張番を5個以上/ハウス）	1頭以上/ハウス	は種前（土壌消毒）または即時		山口県
ハウレンソウ	ハウレンソウケナガコナダニ	播種前	土500gを採取し乾燥酵母トラップ3枚を設置し、3日後の誘引数を調査	5頭/トラップ	生育期		福井県
アスパラガス	ネギアザミウマ	発生期	払い落とし、1圃場あたり数ヶ所	1ヶ所あたり1～5頭/10×20cm板上	即時		香川県
アスパラガス	ネギアザミウマ	発生期	払い落とし、1圃場あたり10ヶ所以上	1ヶ所あたり1頭/10.5×22.5cm板上	即時		長崎県
アスパラガス	斑点病	—	見取り調査	主茎に病斑が散見される程度（発病度12.5以上）	即時		北海道

作物名	病害虫名	調査時期	調査方法	要防除水準	防除時期	備考	都道府県
いちご	ハダニ	随時	見取り調査	寄生小葉率20%または1頭／小葉	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県
いちご	アザミウマ類	発生期	見取り調査	寄生成虫数が100花当たりで10頭または、成虫の寄生花率10%	即時		香川県
いちご	ミカンキイロアザミウマ	随時	払い落とし	10頭／30花房	即時	(要防除密度の目安)	兵庫県