

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	マメコバチ	なし (5%フロアブル)		農業ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	蛹は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	ショクガタマバエ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。

影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。

(注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	パーティシリウムレカニ	胞子は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロマフェノジド	マトリック	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリスは混用できない剤としても、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	コレマンアブラバチ	マミーは◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は×、成虫は×、影響のなくなるまでの期間は14日以上		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は×、影響のなくなるまでの期間は9日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は1日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は9日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	エルビニアカロトポーラ	菌は×	エルビニアカロトポーラは乳剤との混用はできないが、3日以上 の散布期間であれば 近接散布が可能。	天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
クロルフルアズロン	アタブロン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリス は混用できない剤と でも、翌日以降の近 接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	成虫は◎、影響のなくなるま での期間は0日		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のな くなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	コレマンアブラバチ	マミーは◎、成虫は◎、影響 のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	成虫は◎、影響のなくなるま での期間は0日		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は×、成虫は△		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	ショクガタマバエ	幼虫は◎、成虫は◎、影響の なくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は○、成虫は◎、影響の なくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響 の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	ネマトーダ類	幼虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	パーティシリウムレカニ	胞子は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ジフルベンズロン	デミリン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	ポーベリアバシアーナ	分生子は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は○、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	コレマンアブラバチ	マミーは◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	サバクツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	チチュウカイツヤコバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は×、成虫は×		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	ショクガタマバエ	成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	エルビニアカロトボース	菌は◎	エルビニアカロトボースは乳剤との混用はできないが、3日以上 の散布期間であれば 近接散布が可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	ネマトーダ類	幼虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	パーティシリウムレカニ	胞子は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
シロマジン	トリガード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリスは混用できない剤としても、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テブフェノジド	ロムダン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テブフェノジド	ロムダン, ガードワン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ケナガカブリダニ	なし		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
テブフェノジド	ロムダン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テブフェノジド	ロムダン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テブフェノジド	ロムダン, ガードワン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	クモ類	キバラコモリグモ	なし		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
テブフェノジド	ロムダン, ガードワン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	クモ類	ニセアカネグモ	なし		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
テブフェノジド	ロムダン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリスは混用できない剤としても、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	天敵類	天敵全般	少ない		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	コレマンアブラバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	サバクツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	蛹は◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	アリガタシマアザミウマ	幼虫は×、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は×、成虫は△		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は×、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は14日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	スワルスキーカブリダニ	卵は◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	ネマトーダ類	幼虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
テフルベンズロン	ノーモルト	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリスは混用できない剤としても、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ノバルロン	カウンター	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	若干の影響を認める		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
ノバルロン	カウンター	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	影響認められない		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
ノバルロン	カウンター	殺虫剤	昆虫成長制御剤	クモ類	ウツキコモリグモ	影響認められない		農薬ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	幼虫は○、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は1日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	幼虫は○、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	成虫は○		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	スワルスキーカブリダニ	成虫は○		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ピリプロキシフェン	ラノー	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	成虫は○		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	天敵類	天敵全般	実用濃度で影響なし		農業ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は○、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は7日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	コレマンアブラバチ	マミーは◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	サバクツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	チチュウカイツヤコバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	アリガタシマアザミウマ	幼虫は◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は△、成虫は△、影響のなくなるまでの期間は7日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	ショクガタマバエ	幼虫は△、成虫は△、影響のなくなるまでの期間は7日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は○、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は○、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	スワルスキーカブリダニ	成虫は○		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は○、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	卵は○、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は○、成虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	ネマトーダ類	幼虫は○、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バーティシリウムレカニ	胞子は○		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は○	バチルスズブチリスは混用できない剤とでも、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ○:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	イサエアヒメコバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	コレマンアブラバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	チチュウカイツヤコバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ハモグリコマユバチ	幼虫は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヤノネキヒロコバチ	1,000倍液散布後放虫し、24時間後死亡率27.7%		農業ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	アリガタシマアザミウマ	幼虫は×、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は△、成虫は×		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は△、成虫は×、影響のなくなるまでの期間は28日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ケナガカブリダニ	2,000倍液散布後放虫48時間後死亡率7.1%		農業ハンドブック2005	(社) 日本植物防疫協会	2005

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]
 天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は△、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	シュードモナスフルオレッセンス	菌は×		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	パーティシリウムレカニ	胞子は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
フルフェノクスロン	カスケード	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリスは混用できない剤としても、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
メトキシフェノジド	ファルコン	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	スワルスキーカブリダニ	卵は◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフェメロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	オンシツツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフェメロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	サバクツヤコバチ	蛹は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフェメロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	チチュウカイツヤコバチ	成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフェメロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	寄生性天敵	ヨトウバチ類	成虫は○		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%

化学農薬の天敵に対する影響情報一覧表 (昆虫成長制御剤)

化学農薬の天敵類に対する影響について既存の文献を調査して得られた情報を、一覧表にまとめました。
 影響の内容については文献に記載されたものをそのまま収録しました。
 (注意:天敵に対する影響は、気象条件など環境により変動します。ここに記載された情報についてはひとつの目安としてご利用下さい。)

農薬種類名 (成分一般名)	代表的な商品名	農薬用途	農薬系統分類	天敵グループ名称	天敵名	影響内容	備考	出典(標題)	出典(著者)	出典(年)
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	アリガタシマアザミウマ	幼虫は×、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	クサカゲロウ類	幼虫は×、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	ショクガタマバエ	成虫は△		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性天敵	タイリクヒメハナカメムシ	幼虫は△、成虫は△、影響のなくなるまでの期間は14日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ククメリスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	スワルスキーカブリダニ	卵は◎、成虫は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	チリカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	デジェネランスカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	捕食性ダニ類	ミヤコカブリダニ	卵は◎、成虫は◎、影響のなくなるまでの期間は0日		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	バチルスズブチリス	芽胞は◎	バチルスズブチリスは混用できない剤としても、翌日以降の近接散布は可能。	天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009
ルフエヌロン	マッチ	殺虫剤	昆虫成長制御剤	その他	ポーベリアバシアーナ	分生子は◎		天敵類に対する農薬の影響の目安の一覧表 (第18版)	日本バイオリジカルコントロール協議会	2009

影響内容の記号の見方 [出典が「バイオリジカルコントロール協議会」のもの]

天敵等に対する影響は (野外・半野外試験) ◎:死亡率0～25%、○:25～50%、△:50～75%、×:75～100%、(室内試験) ◎:死亡率0～30%、○:30～80%、△:80～99%、×:99～100%